



Francisco Javier Pérez López

**NATANAEL EZRI PRADO
HERNANDEZ**

“Caso clínico V”

Materia: Farmacología

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 3° semestre

Comitán de Domínguez Chiapas a 1 de julio del 2021

LEE CUIDADOSAMENTE Y CONTESTA LO MAS ADECUADO

Hombre de 68 años con antecedente de angina de pecho estable y DM2; en tratamiento con nifedipino y metformina. Es llevado a consulta ya que hace una semana presenta en 3 ocasiones desvanecimiento con perdida transitoria del estado de alerta. En este momento sintomático.

¿Lo más probable es que el paciente haya presentado?

Hipotensión ortostática

¿Que debe indicarse como parte del manejo del paciente?

Cambios en el estilo de vida: beber suficiente agua, evitar subir mucho de temperatura, elevar el apoyo de la cabeza en la cama, evitar cruzar las piernas al sentarse y ponerse de pie en forma lenta.

Fludrocortisona como monoterapia de primera línea (0.1-0.2 mg/día)

¿Cuál es el mecanismo de acción del tratamiento del paciente?

Inducen reabsorción del Na por los túbulos renales distales y corticales, uniéndose libremente con la expresión de J e iones H, aumenta la reabsorción de Na en glándulas sudoríparas y salivales.