

Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Terapia Farmacológica

Trabajo:

Cuadro de AINES

Docente:

Dr. Rodrigo Pacheco Ballinas

Alumno:

Jennifer Larissa López Sanchez

Semestre y grupo: 4º "A"

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 22 De Marzo del 2021

Nombre	Presentacion	Dosis ponderal y habitual	Indicaciones terapeuticas	Mecanismo de accion	Reacciones adversas
Acido acetilsalicilico	Adiro Aspirina compr. 125 mg, 200 mg, 500 mg sup. 300 mg, 1 g	1200-1500 mg tid	está indicado como antipirético, antiinflamatorio y como antiagregante plaquetario. También es útil para artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante y fiebre reumática aguda.	Inhibe irreversiblemente la COX plaquetaria el efecto antiplaquetario dura de 8-10 dias	En dosis antitromboticas, malestar gástrico y duodenales, hepatotoxicidad, asma, erupciones cutáneas, hemorragia gastrointestinal, aveces toxicidad renal
Celecoxib	está indicado como antipirético, antiinflamatorio y como antiagregante plaquetario. También es útil para artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante y fiebre reumática aguda.	100-200 mg bid	indicado en adultos para el alivio sintomático en el tratamiento de la artrosis, de la artritis reumatoide y de la espondilitis anquilosante.	Inhibidor de la COX-2 alrededor de 10-20 veces mas selectivo para COX-2 que para COX-1	Erupciones,
Meloxicam	Comprimidos 7.5 mg: envase conteniendo 15 comprimidos. Comprimidos 15 mg: envase conteniendo 10 comprimidos.	7.5-15 mg qd	Tabletas de 15 mg Capsulas de 15	Reacciona con el piroxicam que inhibe preferentemente la COX-2 sobre la COX-1	

Diclofenaco		50-75mg qid		Es relativamente no selectivo para inhibir la COX	
Diflunisal		500 mg bid			
Flurbiprofeno		300 mg qid		Su enantiomero inhibe la COX de forma no selectiva	Rigides de rueda dentada, ataxia, temblor y mioclono
Ibuprofeno		600 mg qid		Inhibe la plaquetaria irreversible	Agranulocitosis, anemia aplasica
Indometacina		50-70 mg tid		Es indol procedimiento de inhibición de la COX no selectivo y también puede inhibir la fosfolipasa de células T y B, pancreatitis	Efectos gastrointestinales que puede incluir pancreatitis
Ketoprofeno	está indicada en el tratamiento de la osteoartritis moderada a severa;	70 mg tid	Contraindicado en pacientes alérgicos al ketoprofeno, al ácido acetilsalicílico y a otros antiinflamatorios no esteroideos	Inhibe tanto la COX Como la lipooxigenasa	En el tracto GI, y el sistema nervioso central,
Nebumetona		1000-2000 mg qd5			
Naproxeno	Comprimidos 7.5 mg: envase conteniendo 15 comprimidos. Comprimidos 15 mg: envase conteniendo 10 comprimidos.	375 mn qd			

Oxaprozina		1200-1800 mg qd5			
Sulindaco		200 mg bid		Metaboliza de forma irreversible del sulfuro activo,	
Tolmetina		400 mg qid		Inhibidor no selectivo en un ratito fueron	Eficacia con caderas ancagas

Bibliografía

Farmacología básica y clínica

Bertram G. Katzung

14 edición

<https://web.farmaciasahumada.cl/fasaonline/fasa/MFT/MFT.HTM?w=PRODUCTO-P5889.HTM#:~:text=Indicaciones%3A%20Meloxicam%20es%20un%20antiinflamatorio,%2C%20tenosin%20ovitis%2C%20bursitis%2C%20distensiones>

<https://www.google.com/search?q=indicaciones+terap%C3%A9uticas+de+celecoxib&aq=indicaciones+terap%C3%A9uticas+dels+celeco&aqs=chrome.1.69i57j0i10i22i30.23009j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>