



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Nombre de alumno:
Gordillo López Eric Roberto

Nombre del profesor:
PACHECO BALLINAS RODRIGO

Nombre del trabajo:
Cuadro comparativo

Materia:

TERAPEUTICA FARMACOLOGICA

Grado: 4 Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 27 de febrero del 2021.

Vía de administración	Desventajas	Ventajas
<i>Tópica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Irritación de la piel. • Limita de actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efecto local. • No produce dolor
<i>Sublingual</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Interfiere en situación de alimentos o habla. • No puede ser administrado en situación de inconciencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Efecto rápido • Menos perdida de la concentración del fármaco
<i>Intramuscular</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor ante la administración. • Puede dañar nervios en una mala aplicación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor concentración de fármaco • Efecto rápido
<i>Oral</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Contraindicado en casos de: • Náuseas y vómitos • Intolerancia a fármacos • Inconsciencia y coma 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil administración • Mas barato • Autoadministración
<i>Percutánea</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Solo en pacientes específicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Evita el efecto del primer paso. • Mejor efecto y concentración
<i>Inhalatoria</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Efectos secundarios por rápida absorción de fármacos. • Mas caro 	<ul style="list-style-type: none"> • Efecto rápido • Dosis pequeñas

<i>Endovenosa</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Irritante dolor o necrosis (si extravasación de líquidos). • Dolorosa he incomoda • Posibles secuelas ante bombas de aire 	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de acción inmediato. • Mayor concentración del medicamento.
<i>Parenteral</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dolorosa • Requiere personal capacitado • posibles Infecciones • Transmisión de Enfermedades 	<ul style="list-style-type: none"> • Efecto rápido y sostenido. • Evita el tubo digestivo. • Útil en pacientes • No autónomos o incapaces
<i>Rectal</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absorción irregular e incompleta. • Posible fisura anal. • Incomodidad o dolorosa 	<ul style="list-style-type: none"> • Rápida acción • Accesible

Bibliografía

Cerro/, P. L.-L. (2017). Absorción y distribución de los farmacos . *Velazquez Farmacologia Basica y Clinica 19a Edicion*, 18 - 25.