



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Materia: Propedéutica, semiología y diagnóstico

Dra. Angelita Yesenia Gallardo Gómez

Lesiones primarias de la piel

Alumna: Guadalupe Elizabeth González González

Grado y grupo

4 B

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 23/04/2021

Lesiones primarias de la piel

Mácula

- Constituye una mancha cutánea circunscrita sin elevación ni depresión.
- Pecas
- Rubeola
- Equimosis
- Vitíligo
- Petequias



Vesículas

Son ampollas pequeñas y llenas de un líquido claro, tienen < 10 mm de diámetro.

- Dermatitis alérgica aguda de contacto
- Dermatitis herpetiforme
- Dermatitis atópica (eccema)
- Dermatitis atópica (eccema)
- Dermatitis atópica (eccema)
- Varicela
- Herpes simple
- Varicela
- Herpes zoster



Pápulas

Son lesiones elevadas que suelen medir < 10 mm de diámetro que se pueden sentir o palpar.

- Queratosis seborreicas y actínicas
- Lesiones por acné y cánceres de piel.
- Psoriasis
- Verrugas



Pústula

Son vesículas que contienen pus. Son frecuentes en infecciones bacterianas y foliculitis y pueden aparecer en algunos trastornos inflamatorios como la psoriasis pustulosa.

- Acné impétigo
- Ántrax
- Fúruculos



Ampolla

Cavidad de contenido líquido, de tamaño generalmente mayor de 5 mm. Son uniloculares y se ubican en la epidermis.

- Penfigoide ampolloso
- Dermatitis herpetiforme
- Pénfigo vulgar
- Penfigoide de la membrana mucosa
- Penfigoide o herpes gestacional
- síndrome de la piel escaldada estafilocócica
- necrolisis epidérmica tóxica
- celulitis grave, y ciertas erupciones cutáneas.



Nódulo

Son pápulas o lesiones firmes que se extienden dentro de la dermis o el tejido subcutáneo.

- Quistes
- lipomas
- fibromas
- clamidia
- Histoplasmosis



Tumor

Son masas o crecimientos anormales en el cuerpo y pueden diferenciarse en benignos o malignos.

- Sistema inmunitario debilitado
- Exposición a la radiación
- Antecedentes personales de cáncer de piel.
- Antecedentes familiares de cáncer de piel.



Roncha

- **Aguda espontánea:** cuando la roncha dura menos de 6 semanas y se debe a algún tipo de alergia.
- **Crónica espontánea:** si permanece más de 6 semanas y suele ser por causa desconocida.
- **Estrés emocional**

Enfermedades:

- **Hormonales**
- **Renales**
- **Hepáticas**
- **Transtornos autoinmunitarios**
- **Leucemia y procesos infecciosos**

