



# **Universidad del Sureste**

## **Escuela de Medicina**

**Materia:**

**TERAPEUTICA FARMACOLOGICA**

**Mapa mental de la escala analgésica de la OMS.**

**Docente:**

**RODRIGO PACHECO BALLINAS**

**Alumno: Alfredo Morales Julián**

**3-B**

**Lugar y fecha**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 29/04/2021.**

**Analgésicos no opioides**

±

**Coanalgésicos**

**Paracetamol, metamizol,  
ibuprofeno, diclofenado,  
AINES, coadyuvantes**

**Escalón 1**

**Opioides débiles**

±

**Coanalgésicos**

±

**Escalón 1**

**Tramadol, petidina,  
pentazocina, coadyuvantes**

**Escalón 2**

**Escala analgésica  
de la OMS**

**Escalón 3**

**Escalón 4**

**Opioides potentes**

±

**Coanalgésicos**

±

**Escalón 1**

**Morfina, buprenorfina,  
oxicodona, hidromorfona,  
fentanilo, coadyuvantes**

**Métodos invasivos**

±

**Coanalgésicos**

## Conclusión:

La escala analgésica de la OMS fue publicada en 1986 por el “Comité de Expertos Internacionales” en un documento sobre alivio del dolor en el cáncer y está destinado a los países subdesarrollados.

Una de sus principales prioridades era el control del **dolor oncológico**.

Es muy importante porque fue creada por la OMS para ser una guía que sirve para aliviar el dolor de los pacientes según la intensidad del síntoma. Para eso se debe de tener conocimiento del dolor, los tipos de dolores y una escala de dolor para ser más específicos.

## Referencias

Díaz, F. P. (28 de 01 de 2005). *Oncología Radioterápica Instituto Madrileño de Oncología San Francisco de Asís*. Obtenido de [http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/anestesiologia/tipos\\_de\\_dolor.pdf](http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/anestesiologia/tipos_de_dolor.pdf)

Grünenthal Pharma, S.A. (16 de 04 de 2016). *dolor.com* . Obtenido de <https://www.dolor.com/para-sus-pacientes/manejo-y-tratamiento-del-dolor/tratamiento-farmacologico-escala-analgésica-oms>