



**Universidad del Sureste
Escuela de Medicina**



TRASTORNO DE TOURETTE

PRESENTA

Ángel José Ventura Trejo

Neurología

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Comitán De Domínguez, Chiapas, 10 de marzo del 2021

Trastorno de Tourette

A lo largo del tiempo la literatura a cine y la televisión han optado por presentar personas con este síndrome frecuentemente, también, han mostrado personas con Alzheimer, epilepsia, lesiones medulares, enfermedad de Parkinson o la parálisis cerebral esto solo por mencionar las más comunes.

Las tics del síndrome de Tourette se pueden definir como movimientos rápidos estereotipados, que son involuntarios, además son recurrentes pero estos mismos no son propósitos de la musculatura esquelética y forínsea, aunque todo esto son involuntarios algunas veces pueden ejercer cierto control sobre los movimientos, no de forma completa y mucho menos permanentemente pero cuando aparecen se manifiestan con mayor intensidad.

Las tics están precedidas de una fase premonitrice y se siente como algo desagradable e imposible reprimir, aunque el paciente lo intente, cuando sucede el tic el paciente percibe una sensación momentánea de paz, pero las tics pueden llegar a intensificarse cuando el individuo está sometido a una situación emocional intensa o bien tienen condiciones de estrés.

Los síntomas pueden mantenerse estables durante un cierto tiempo pero suelen variar espontáneamente de una época a otra de la vida. Pero se logran disminuir durante la distracción o la atención sin ansiedad, también durante el sueño y aumenta con la tensión emocional.

En este punto se dice que se puede suprimir durante un muy breve tiempo pero eso a la persona le genera ansiedad ya que vive con el estrés de que en cualquier momento puede desaparecer sus síntomas y es por eso que tienen la necesidad de disminuir sus síntomas.

Los movimientos pueden ser simples pero con una frecuencia pueden ser complejos, como sacudidas de cabeza distorsiones faciales, saltos o gestos. ~~obsesiones~~ obsesiones (copraxis), existe su clasificación para su sintomatología que pueden ser tics motores y tics simples y tics sensoriales. Según su duración podemos observar dos tipos los que son transitorios y los crónicos. Según su etiología encontramos primarios y secundarios, por lo que podemos clasificar de manera más clara y precisa.