



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Esclerosis múltiple- tratamiento

Materia: Neurología
Docente: Jose Luis Gordillo Guillen
Integrante: María del Pilar Álvarez Sánchez
Semestre: 6º "A"

ESCLEROSIS MULTIPLE

tratamientos

SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES

- DOLOR
- FATIGA
- DISFUNCIÓN DE EGFINTEROS
- DISFUNCIÓN SEXUAL
- ALTERACIÓN DE COORDINACIÓN
- ESPASTICIDAD
- ANÍMO

1) DOLOR

- CEFALEA = IBUPROFENO, NAPROXENO, PARACETAMOL
- NEURALGIAS - DISESTESIAS = ANTIEPILEPTICOS (PREGABALINA, GABAPENTINA), ANTIDEPRESIVOS (AMITRIPTILINA) OPIACEOS (TRAMADOL)
- NEURALGIA DEL TRIGÉMINO = CARBAMAZEPINA, OXCARBAZEPINA, LACOSAMIDA

2) FATIGA

- EJERCICIO FÍSICO
- EVITAR DEPENDENCIAS
- FARMACOS = AMANTADINA, METILFENIDATO, ANTIDEPRESIVOS

3) DISFUNCIÓN SEXUAL

- ANORGASIA = REUZAR
- DISFUNCIÓN ERECTIL = SILDENAFILO, TACAFILIC

4) ESPASTICIDAD

- EJERCICIOS (REHABILITACIÓN FISIOTERAPÉUTICA)
- INVASIVOS = BACLOFENO, TOXINA BOTULÍNICA
- FARMACOS = BACLOFENO, TIZANINA, ZATIURTA

5) DISFUNCIÓN DE EGFINTEROS

- CONTINENCIA = FARMACOS, ENEMAS
- RETENCIÓN URINARIA = TAMSULODINA, AUTONANAJES.
- URGENCIA MICCIONAL = MEDIDAS HIGIÉNICAS, TOLTERODINA, FEOSTEDINA

6) ALTERACIONES COGNITIVAS

- REHABILITACIÓN
- SOPORTE

7) TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS / ANÍMO

- DEPRESIÓN = PSICOTERAPIA, ANTIDEPRESIVOS (PREGABALINA), EJERCICIO FÍSICO
- ANSIEDAD = BENZODIAZEPINAS, PSICOTERAPIA, SOPORTE, EXTRACTOS