



# **Universidad del Sureste Escuela de Medicina**

**TDAH**

PRESENTA

Ángel José Ventura Trejo

Neurología

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Comitán De Domínguez, Chiapas, 22 de febrero del 2021

Angel Jose Ventura Trejo

## Síndrome de hiperactividad y déficit de atención

En este artículo menciona que una causa de este síndrome es el metabolismo lo cual dice que según la comprobación de los artículos científicos es una relación muy estrecha y que los pediatras hasta cierto punto podían retrasar el diagnóstico dado esto por el tamiz mencionaba los rangos normales de algunas hormonas y por ende podían decir que los pacientes se encontraban bien y es sino hasta después que lo diagnostica un neurólogo.

El término disfunción cerebral mínima dado por Clement en 1966 el cual el término usado hasta hoy en día aún es estudiado ya que menciona que es un término simple que explica mucha información, mientras que también explican sobre los daños durante la etapa de mayor desarrollo que hay en una persona, ya que cuando se nace es con una cantidad enorme de células cerebrales y no hay un daño en sí como tal por lo que mientras crece se reflejan los daños que se logra o se pudo hacer, sin embargo, esta etapa que menciona anteriormente es desde la semana 30 de gestación hasta los 4 años siendo estas rangos muy generales, pero posterior a esta etapa aún hay crecimiento y proliferación de células dendríticas también multiplicación glial, además de proliferación de oligodendrocitos y cambios en la mielinización.

El síndrome por déficit de atención con hiperactividad es ampliamente estudiado como muestra de ello esta que hace más de veinte años esta la descripción sobre los signos y síntomas principales dado por Strauss, sin embargo, existe una infinidad de signos y síntomas diferentes, pero solo algunos se logran generalizar entre los pacientes con este síndrome.

entre estas se debe de identificar si la persona tiene signos o no de hiperactividad pero entendiendo que no todos lo podran tener visibles, además de esto este síndrome tiende a ser multifactorial con diferentes grados diferentes de manifestación. El niño afectado tendrá una alteración en su conducta, en como se percibe a si mismo y su función orgánica en su completo funcionamiento.

Para el diagnóstico se basara en clínica observando ya que ellos pueden tener un trastorno de oposición desafiante este mismo donde son negativos y tienen ira lo cual le debe de mantener durante 6 meses en este presenta. Confrontaciones con autoridades como son los padres y los maestros.

O bien pueden tener algún trastorno de conducta en el cual pueden haber violaciones a reglas Sociales (Antisociales) y los derechos de otras personas pueden haber cuatro tipos • agresión a personas y animales • destrucción a la propiedad • mentira y robo • por último, violaciones graves de las reglas.

En niños con TDAM la hostilidad con padres es nula. Puede que no haga caso pero no agrede a ellos. Presencia de síntomas más notorios a menor edad, y la desorganización familiar es por las reacciones que tiene el niño ante su ambiente.