

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Neurología

Sx Tourette

Dr. José Luis Gordillo Guillén

Thania Guadalupe López Guillén

Síndrome de Tourette

Vídeo 1:

Es un trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por tics motores y vocales repetitivos, recurrentes e involuntarios que persisten en un patrón variable en frecuencia e intensidad.

Su prevalencia se ha estimado entre un 0.46% y 1.76% de la población con la primera aparición de síntomas entre los 5 y 18 años y edad media entre 6 y 8 años. En este vídeo se observa como un niño con este padecimiento, se complica su convivencia con otros niños puesto a que se burlan de él, él afirma frente a todos que es una enfermedad, que no puede controlar y que además no tiene cura, pidiendo que lo que pueden hacer por él es darle un trato igualitario, que dejen de burlarse porque él no lo hace de manera intencional. Así debería ser; tener más empatía unos con otros.

Video 2

Al inicio de los tics vocales suelen ser posteriores a los tics motores. Son comunes las sensaciones premonitorias asociadas a la expresión de tics y se pueden presentar ecolalia, copraxia, palilalia y coprolalia. La ecolalia y palilalia consisten en la repetición involuntaria de palabras, sílabas o frases, la copraxia en la imitación y repetición de movimientos mientras que, la coprolalia se caracteriza por un fuerte impulso involuntario a verbalizar obscenidades e insultos. En el video nos mencionan que en las escuelas de EUA hay por lo menos un niño con tourette y como es que experimentan el tener esta enfermedad, caracterizada por realizar movimientos involuntarios, parpadear, moverse compulsivamente haciendo que molesten a las demás personas, como en el video anterior considero importante tener empatía y conocer más de este tipo de trastornos para poder entenderlos mejor.