

UNIDAD I
NEUROLOGÍA

RESUMEN

Alumno: ADRIANA LIZZEHT SANCHEZ MORALES

DR. JOSÉ LUIS GORDILLO GUILLÉN

MEDICINA HUMANA

SEXTO SEMESTRE "A"

Resumen

Síndrome de Tourette

Los Tics son movimientos rápidos, estereotipados, involuntarios, recurrentes y sin propósito de los músculos esqueléticos y faríngeo-laríngeo. En el síndrome de Gilles de la Tourette, varios tics se asocian a vocalizaciones involuntarias (ecolalia, coprolalia). Son de comienzo en la infancia y suelen estar asociadas a conductas obsesivo-compulsivas. Estos trastornos han aparecido en cantidad de intelectuales, se pueden presentar desde diferentes perspectivas que en ocasiones son muy realistas.

Este síndrome se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia antes de los 18 años, se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año. También hay tics vocales los cuales se producen generalmente junto con los movimientos. Si bien los síntomas del sx de Tourette difieren de una persona a otra y varían de muy leves a graves. Las afeciones relacionadas pueden incluir problemas de atención (TDAH/TDA), impulsividad y trastorno desafiante de oposición, conducta que es obsesiva compulsiva y trastornos del desarrollo de aprendizaje, por lo general hay un historial de Tics, Síndrome de Tourette, TDAH o TOC en la familia.