



**Universidad del Sureste**  
**Escuela de Medicina**

**VIDEO Trastornos del espectro autista**

**DOCENTE: Dr. Gordillo Guillen José Luis**

**ALUMNO: Jesus Alberto Perez Dominguez**

**MATERIA: Neurología**

**CARRERA: MEDICINA HUMANA**

**SEMESTRE: 6 "A"**

**FECHA: 26 de febrero del 2021**  
**Comitán de Domínguez, Chiapas**

# Trastornos del espectro autista

(4) Trastornos del espectro autista

youtube.com/watch?v=s9bYRexDYvg

Aplicaciones Google Bienvenidos | Unive... BM booksmedicos Libr...

YouTube MX

Buscar

Trastornos del espectro autista

108,953 vistas • 4 mar. 2016

1760 93 COMPARTIR GUARDAR ...

viernes, 26 de febrero de 2021

Escritorio 03:22 p. m.

**Trastornos del espectro autista: Importancia del diagnóstico...**  
INPRFM  
5784 vistas • hace 1 año  
1:17:15

Todos Presentaciones Vídeos relacionados

**ÚNICO**  
Brincar por un Autismo Feliz  
259,661 vistas • hace 2 años  
28:42

**TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA). TEA EN...**  
Srta Jess  
344,106 vistas • hace 4 años  
11:11

**Diagnóstico diferencial entre TDAH y TEA - Amanda Meliá**  
ISEP  
11,655 vistas • hace 1 año  
1:50:38

**El Autismo es un Problema de Atención**  
Dr. Mauricio Leija. Paidopsiquiatra  
56,549 vistas • hace 4 meses  
34:59

## Trastornos del espectro autista (Video).

Trastorno del neurodesarrollo: Inicia en los primeros 2 años de vida, los síntomas se manifiestan muy temprano, el déficit persiste en todo el desarrollo. Autismo y sus 3 dimensiones alteradas (reciprocidad social, intereses restringidos repetitivos, lenguaje). DSM-5: Desarrollo típico: presente en todos los niños y es por edad. TEA no especificada: cumple con algunos criterios, pero no cumple con todos los criterios diagnósticos; Autismo atípico (73 años de edad), Trastorno de Asperger (Intelectual normal + Desarrollo de lenguaje)

Trastorno de espectro autista? factores de riesgo = edad materna (>35 años) y paterna avanzada (>38 años), tabaquismo materno, factores prenatales, ambiente (intoxicación por organofosforados), diagenésis (madre), hermanas monozigotas (90%).

Síntomas tempranos = Fijación visual persistente en objetos (no sociales) (1-2 años de edad), movimientos repetitivos anormales (balanceo, camina de puntillas, mira sus manos), ausencia de balbuceo o primeras palabras, ausencia de comunicación (sonrisa social, gestos), disminución en la interacción social, aislamiento social, pérdida de contacto visual. Criterios Diagnósticos (DSM-5) = 1) Reciprocidad y comunicación social, movimientos estereotipados y conductas repetitivas, Hiper o Hipoactividad (indiferencia al dolor/temperatura), comorbilidad, discapacidad intelectual, TDAH, depresión, ansiedad, TOC, TIC'S, Epilepsias.

Diagnóstico Temprano = Intervención intensiva, especializada y temprana; Mejorar la cognición, social y la adaptación, cuestionario (CHAT, M-CHAT, ADI-R). Hallazgos de neuroimagen (patrones anormales de crecimiento en lóbulo frontal, tempurales y occipitales). Tratamiento no farmacológico = psicoeducación familiar, terapia física. Farmacológico = Estimulantes / antipsicóticos.