



**Universidad del Sureste
Escuela de Medicina**



ENFERMEDAD DE CANAVAN

PRESENTA

Ángel José Ventura Trejo

Neurología

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Comitán De Domínguez, Chiapas, 25 de mayo del 2021

El temblor de la noche son aquellos
los terremotos que se dan en las horas
de la noche (generalmente entre las 10 y las
de la mañana) que en un momento
de mayor actividad sísmica, por
las causas de actividad sísmica
relacionadas de una zona de la corteza
de la tierra se clasifican en noche
a los terremotos que se dan
que se dan a las 22:00 horas.
Clasificación, según la actividad
relacionada, los terremotos clasificados
en España, se mantienen entre de
la noche y la mañana, la actividad
del temblor, se relaciona entre
otros a los más de terremotos

En cuanto al momento de la
aparición de un temblor sísmico
que es proporcional, tiene una
alta probabilidad de que se produzca
entre las 10 y las 20 horas de la noche.
El 27 de octubre, por ende
cuando se producen terremotos
a la hora distinta a los días
más común en estas zonas.

Hasta ahora la heterogeneidad del
temblor sísmico no se refleja en
ninguna clasificación y se espera
que la documentación precisa de
la evolución sísmica y la histo-
ria sea útil para que más
adelante se pueda abordar
el temblor sísmico.

El temblor sísmico se define
como un temblor que se da en
las mismas zonas que la actividad
pero cuando los terremotos no
afectan las mismas áreas de
la actividad se le puede llamar