



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

“Resumen de epilepsia de panayiotopoulos”

Materia:
Neurología.

Docente:
Dr. José Luis Gordillo Guillen

Alumno:
Oscar Miguel Sánchez Argüello

Semestre:
6° “A”

Epilepsia de Panayiotopoulos Resumen.

Se cumplen todos los siguientes criterios a los seis meses de evolución:

- Una o más crisis no provocadas con síntomas predominantemente autonómicos.
- Presencia de complejos de punta y onda, lentos focales de gran amplitud y morfología funcional en cualquier localización.
- Ausencia de déficit neurológico previo.
- Neuroimagen normal.

Frecuencia y semiología.

- Única crisis. • Sexo varón. • Edad de 3-4 años de inicio.
- Convulsiones febriles previas. • Crisis de más de 5 min de duración.
- Estado epiléptico. • + de una crisis en 24 hrs. • Afección de más de la mitad de las crisis durante el año con origen.
- Versión cefálica u ocular. • contracciones clónicas generalizadas.

Definición: Epilepsia occipital caracterizada por crisis nocturnas con desviación tónica de los ojos, vómitos, punta-onda occipital en el electroencefalograma (EEG) y un buen pronóstico, benigno dependiente de la edad, de crisis focales, caracterizado por episodios con frecuencia prolongados, con síntomas autonómicos predominantes, con focos múltiples o cambiantes, con predominio occipital.

Evolución inicial: Se realiza un EEG estentando, aquellos con más de una crisis y un EEG occipital.