



Universidad del Sureste



Escuela de Medicina

“resumen”

Materia:

Neurología

Docente:

Jose Luis Gordillo Guillen

Alumno:

Tarsis Andrea Guillén Narváez

Semestre:

6° “A”

Los síntomas invisibles de la esclerosis múltiple y su tratamiento

El tratamiento para la esclerosis múltiple están orientados a un carácter modificador, rehabilitador y sintomático

+ Síntomas

- Dolor
- Fatiga
- Disfunción de esfínter
- Espasticidad
- Disfunción sexual
- Cognición
- Cambios en el estado de ánimo

Se puede tratar la cefalea con AINES, ejemplos de ellas Ibuprofeno y naproxeno. En el caso de neuralgias - distonías, pueden ser utilizados antiepilépticos como la pregabalina o gabapentina, o bien igual se puede utilizar antidepresivos como duloxetina. Por otro lado en el caso de neuralgia del trigémino se puede incluso realizar cirugía.

La disfunción de esfínteres (urgencia miccional) se pueden utilizar Toxina botulínica, tolterodina y una higiene adecuada. En la retención urinaria se puede tratar con autosondas o tamsulosina, en el caso de estreñimiento usar fármacos o enemas.

En disfunción sexual sexual

- Disfunción esteril → Sildenafil, tadalafil
 - Anorgasmia → Buscar fármaco que lo produzca
- La alteración cognitiva no tiene tratamiento

farmacológico, es por ello que se pueden implementar medidas de rehabilitación

Espasividad

- Bexoreno

- Tizanidias

En caso de trastornos de ansiedad o depresión

- Terapia de higiene de sueño

- Psicoterapia

