



# Universidad del Sureste

## Escuela de Medicina

**Resumen Sx de Tourette PDF**

---

**Materia: neurología**

**Presenta: Raymundo López Santiago**

**Semestre: 6° "A"**

09/03/2021

## Sx de Tourette. PDF

### Introducción

Los tics pueden definirse como movimientos rápidos, estereotipados, involuntarios, recurrentes y no propulsivos de la musculatura esquelética y faringolaringea.

• Los movimientos son simples, con- que con más frecuencia son comple- jos, como sonrisas de sardas, distorsiones faciales u otros signos de obsesión (coproproaxia).

Algunos son involuntarios, el paciente puede ejercer cierto control sobre estos movimientos, pero no de forma completa o permanente, y cuando reaparecen lo hacen con mayor intensidad.

El síndrome de Gilles de la Tourette varía múltiples tics a vocalizaciones involuntarias, insultos, profanas obscenas e impropias sexuales coge- rivas.

Los tics se exageran cuando el individuo está sometido a estrés o a una situación sentimental intensa.

Habitualmente aparece en la infancia, en un principio suele ser un simple tic, pero posteriormente se unen otros tics y vocalizaciones, y se pueden tener comportamientos obsesivos compulsivos.

Lo que indicaría que, si bien con la explicación de un trastorno orgánico, existe también una posible influencia psicogena o psicomática.

En 1885, Gilles de la Tourette (1857-1901) describió nacimamente nueve pacientes con tics motores y vocalicos.

Los síntomas disminuyen durante la distracción o durante la tensión de ansiedad, desaparecen durante el sueño y aumentan con tensión emocional.

Algunos de ellos presentaban emisiones vocales obscenas (coprolalia), repetición de palabras (palilalia), ecolalia y palilalia, y más tarde describió en estos pacientes comportamientos obsesivos compulsivos, ansiedad y fobias.

Pueden apremiarse voluntariamente durante un tiempo breve, pero esto genera gran ansiedad y la necesidad de "dejarse" los síntomas.