

UNIDAD I
NEUROLOGÍA

RESUMEN

Alumno: ADRIANA LIZZEHT SANCHEZ MORALES

DR. JOSÉ LUIS GORDILLO GUILLÉN

MEDICINA HUMANA

SEXTO SEMESTRE "A"

Epilepsia de PANAYIOTOPOULOS

5

Desde su definición se menciona es una epilepsia occipital caracterizada por crisis nocturnas con desviación tónica de los ojos, vómitos, punta-oncia en el EEG y es de buen pronóstico, también como un grupo en trastorno benigno, dependiente de la edad, de crisis focales caracterizadas por episodios, de frecuencia prolongada con síntomas autonómicos predominantes y un EEG que muestra focos múltiples o cambiantes a menudo con predominio occipital. Para su diagnóstico dentro de seis meses deben de cumplir lo siguientes criterios tras la evolución:

- Una o más crisis no provocadas con síntomas predominantes autonómicos.
- Presencia de complejos de puntas y oncas lentas focales de gran amplitud y morfología funcional en cualquier localización.
- Ausencia del déficit neurológico previo.
- Neuroimagen normal.

Dentro de las variables semiológicas no se conoce una lista de síntomas, considerado ausente. En este estudio mencionado en el PDF se incluye que dentro de esta epilepsia se emplea definición clásica y se incluyen casos con dos o más crisis