



**Universidad del Sureste**

**Escuela de Medicina**

**“resumen”**

---

**Materia:**

**Neurología**

**Docente:**

**Jose Luis Gordillo Guillen**

**Alumno:**

**Tarsis Andrea Guillén Narvárez**

**Semestre:**

**6° “A”**

## Síndrome de Tourette video 1

Es un trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por tics motores y vocales repetitivos, recurrentes y involuntarios que presentan un patrón variable en frecuencia e intensidad durante al menos un año.

Presenta una aparición de síntomas en la mayoría de casos dentro de los 5 y 18 años, con una edad media de 6 años.

En el video podemos observar a un niño con sintomatología clara de un síndrome de Gilles de la Tourette, ya que como se ve presenta tics motores y vocales, los cuales eran de forma repetitiva.

Algo importante a recalcar es el cómo la sintomatología se presenta con más intensidad en situaciones de estrés o ansiedad. Estas situaciones generan que los tics suelen ser más intensos y repetitivos.

Se ha notado mayor severidad de sintomatología en los casos donde el inicio de estos tics son a edades tempranas y con ello ir aumentando hasta la adolescencia, posterior a esta suelen ir siendo menos graves.

## Trastorno de Tourette video ①

Es un trastorno neurológico con el que se nace y produce tics.

Las investigaciones realizadas en las últimas décadas sobre este Síndrome han tenido un enfoque más relacionado a las determinantes genéticas de este síndrome, las bases neuroanatómicas y neuroquímicas con el objetivo de un mayor entendimiento de la etiología y tratamiento de este.

Los niños con este trastorno presentan cambios en la forma de expresarse, es decir no adecuado al entorno en el que están, ya que se podría decir que los tics presentados en un lugar "tranquilo" para ellos como su hogar, hace que estos se presenten de forma menos intensas aunque si tienen una repetición, frecuencia y intensidad durante los presente. Esto se ve modificado cuando el paciente acude a lugares públicos, provocando que los tics se vuelvan más intensos, repetitivos y frecuentes, y todo esto lleva a que los pacientes sean juzgados, riendo de ellos hasta el grado de aislarlo lo que produce mayor estrés y ansiedad al

paciente.

Algunos de los factores para que se desarrollen los tics son como:

- Estrés
- Ansiedad
- Fatiga
- Positividad
- Cansancio
- Sobrecarga emocional
- Frustración