



Universidad del Sureste  
Escuela de Medicina

---

**Video: Ataxia**

---

**Docente:**

Dr. José Luis Gordillo Guillen

**Materia:**

Neurología

**Alumno:**

Karla Gpe. Alvarado López

**6 Semestre Grupo A**

**10/marzo /2021**

## Paciente con Ataxia.

10/03/21

La Ataxia Cerebelosa, claramente existe afectada a Nivel del Cerebelo. Los Pacientes se identifican claramente con la Marcha Atáxica, mayormente en etapas avanzadas. A la exploración física igual puede detectarse una descoordinación de Maniobra con los Brazos (dismetria)

La dismetria es otro signo característico, al igual puede observarse disdiadococinesia. (dificultad de realizar movim. de pronosupinación con los Brazos). En la Maniobra de Taldón yadilla experimentan dismetria. Existe alteración así también de los movimientos oculares (Nistagmo). Todas estas manifestaciones constituyen un sx cerebeloso.

Existen más de 200 etiologías para una Ataxia cerebelosa en las cuales más de 100 son genéticas

### • Clasificación de las Ataxias

Ataxias Adquiridas: Letus, EM, tumor, Autoinmune, Carencial.

Ataxias Degenerativas: Dominantes, ligadas al CrX, recesivas, Mitocendriales.

Ataxias Degenerativas No Hereditarias: AMS-C y SAOA

Deben tomarse varios puntos para determinar y clasificar la Ataxia, en este caso cerebelosa

Es Ataxia; cerebelosa, vestibular o sensorial, El curso Clínico, Historia familiar, Edad de inicio, (inicio precoz o tardío), si existe afectación de otros sistemas, por último nos apoyaremos en pruebas complementarias

La mayoría de Ataxias degenerativas carecen de un Tratamiento con excepción de algunas

Ante ataxia cerebelosa, debe principalmente descartarse causas Adquiridas, posteriormente identificar si es una

Ataxia Aguda o Subaguda/crónica. (tóxica, Autoinmunes, Anti-GAD)

Principalmente nos encontramos con Ataxias Crónicas, posterior a esto debe identificarse si es esporádica o Familiar.

Más Comunes Ataxias Recessivas, Ataxias de Friedreich. Ataxias diferenciales de Ataxias Recessivas.

- Alteraciones oculomotoras, Ataxia de Niemann-Pick,
- Ataxia Telangiectasia, Retinitis pigmentosa (fondo de ojo) → signos oftalmológicos.

Realización de R.M. es de gran utilidad para dx de Ataxias

- Neuropatía Sensitivo-Motora
- Ataxias espásticas.
- Marcadores séricos ayudarán en el dx diferencial

Atrofia Multisistémica cerebelosa (AMS-C): hipotensión ortostática, TCR, Piramidalismo, Disfunción vesical.

CANVAS: Sx de Ataxia cerebelosa, Neuropatía y aneflexia vestibular