



**Universidad del Sureste
Escuela de Medicina**

Miastenia gravis

Docente: Gordillo Guillen José Luis

Materia: Neurología

Alumno: Gómez Albores Roberto

Semestre: 6° Grupo A

10/Julio/2021

Roberto Gímez Albaros

Neurología

28.06.2021

Polineuropatía Inflamatoria Crónica

La polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC) es una neuropatía inflamatoria cronicizada clásicamente por una afectación sensitivo-motora simétrica y de inicio lentamente progresivo sin embargo existen muchas variantes fenotípicas lo que sugiere un CIDP puede ser no una entidad de enfermedad discreta sino más bien un espectro de condiciones relacionadas. Si bien la terapia permanente de la patogénesis de la CIDP es uno de los mecanismos humorales y mediadas por células activas en respuesta inmune aberrante por atacar directamente a los nervios periféricos, las contribuciones relativas de las respuestas de células T y autoanticuerpos permanecen en gran parte metafísicas.

La polirradiculoneuropatía desmielinizante crónica es la neuropatía crónica más común en todo el mundo con una prevalencia que varía de 2.1 a 9 casos por 100.000. La PDIC se presenta típicamente como una neuropatía recidivante o progresiva con debilidad proximal y distal que se desarrolla durante al menos un período de 8 semanas. Aunque CIDP se clasificó como un trastorno autoinmune se el que una respuesta inmune aberrante.