

**Universidad del Sureste**

**Escuela de Medicina**

---

**Neurología**

**Autismo articulo**

**Dr. José Luis Gordillo Guillén**

**Thania Guadalupe López Guillén**

# Neurología

26 02 21

Presentaciones de síntomas y clasificación del trastorno del espectro del autismo en la primera infancia: Aplicación a la clasificación de la salud mental y trastornos del desarrollo de la infancia y primera infancia

En 2010 se determina que hay pocos datos para el diagnóstico del trastorno del espectro autista (TEA). En los últimos 6 años ha surgido una gran cantidad de información sobre el curso temprano del TEA, principalmente de estudios de bebés con alto riesgo por tener un hermano mayor con TEA. El riesgo resulta relativamente alto en estos hermanos.

Los objetivos de este artículo son describir las presentaciones tempranas de los síntomas del TEA. El diagnóstico EA-ASD está diseñado para capturar a los niños que se encuentran dentro de la ventana de riesgo para la aparición de criterios completos para TEA, demostrando que hermanos con TEA tienen un amplio riesgo de presentar estos criterios. Diagnósticos estables ocurren entre 12-36 meses.

En contraste con los tres síntomas de comunicación social y dos síntomas de conducta restringida y repetitiva necesarios para cumplir los criterios de TEA en el DSM-V un mínimo de dos síntomas de comunicación social, uno restringido y los síntomas de comportamiento repetitivo, son necesarios para el diagnóstico de EA-ASD. Solo es apropiado el uso de EA-ASD para bebés y niños pequeños que se encuentren en ventana de riesgo de TEA (12-36 meses).