

UNIDAD I
NEUROLOGÍA

RESUMEN

Alumno: ADRIANA LIZZEHT SANCHEZ MORALES

DR. JOSÉ LUIS GORDILLO GUILLÉN

MEDICINA HUMANA

SEXTO SEMESTRE "A"

Fenomegalia

KUT

y clasificación de la distonía.

La distonía se define como un trastorno del movimiento caracterizado por contracciones musculares sostenidas o intermitentes que provocan movimientos o posturas anormales a menudo son repetitivos.

Los movimientos de distonía suelen ser un patrón y torsión y suelen ser temblorosos. La distonía a menudo se inicia o bien empeora por acción voluntaria o bien se asocia con la activación de los músculos de desbloqueo, la distonía se va

a clasificar en 2 ejes: características clínicas en la cuál incluye la edad de inicio, la distribución corporal, patrón temporal y características asociadas (trastorno del movimiento adicionales

o características neurológicas) así como su etiología que incluye patología y herencia del sistema nervioso.

El término de distonía secundaria también carece de claridad ya que es primario y puede indicar distonía no aislada, una patología definida o más generalmente una etiología conocida.

Estos significados han llevado a confusión ya que el término distonía secundaria a veces se refiere a cualquier distonía que no es primaria.

El término distonía se usa actualmente para indicar al mismo tiempo una fenomegalia motora que engloba al mismo tiempo síndromes neurológicos en los que fenología de la distonía puede ocurrir aisladamente o combinada con otras características neurológicas.

Las caract clínicas describen la fenomegalia de la distonía en un paciente determinado.

Se utilizan como descriptores para específicos caract clínicas.