



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

CUADRO COMPARATIVO DE ANOREXIA Y CAQUEXIA

DOCENTE: Dra. Ana Laura Domínguez

EQUIPO I:

Diana Laura Abarca Aguilar

Diana Carolina Domínguez Abarca

Tarsis Andrea Guillén Narvaéz

Thania Guadalupe López Guillén

Jesús Alberto Pérez Domínguez

Valente Trujillo Sandoval

CUADRO COMPARATIVO	
CAQUEXIA	ANOREXIA
Definición: Marcada baja de peso con compromiso de masas musculares, provoca una pérdida de peso llevando a un estado de inanición.	Definición: Trastorno de la conducta alimentaria que provoca pérdida de apetito.
Etiología: Frecuente en pacientes con cáncer avanzado, sepsis, SIDA, procesos inflamatorios crónicos.	Etiología: Causa desconocida, pero los factores sociales contribuyen.
Clínica: paulatina e involuntaria pérdida del apetito, se acompaña de anorexia.	Clínica: Se puede presentar estreñimiento, amenorrea, depresión, dolor abdominal y vómitos.
Tratamiento: abordaje terapéutico integral.	Tratamiento: corrección de la malnutrición y los trastornos psíquicos del paciente.
<p>Tratamiento paliativo no farmacológico: Buscar alternativas de acuerdo a sus preferencias, cambiar consistencia, recurrir a preparados complementarios como: ENSURE, dulces, cereales, galletas u otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumentar la frecuencia en las colaciones, pero en menores cantidades -Proporcionar un ambiente agradable a la hora de comer <p>Tratamiento paliativo farmacológico: procinéticos (metoclopramida), glucocorticoides.</p> <p>Acetato de megestrol (80-800mg/día): Estimulante del apetito y ganancia de peso principalmente en masa grasa</p> <p>Ciproheptadina: (4mg c/8hrs): Estimulante del apetito</p> <p>Cannabis (todos sus derivados): dronabinol (2,5 mg/8 h oral)</p>	
Complicaciones: Conduce al consumo progresivo de las reservas de grasas y de masas musculares esqueléticas.	Consecuencias: cardíacas, arritmias, hipotensión, amenorrea, anemia y conduce a problemas endocrinos rápidamente.
Pronóstico: Factor de mal pronóstico.	Pronóstico: 50-85% de los pacientes con anorexia de recuperan completamente.