

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ESCUELA DE MEDICINA

6to Semestre

Grupo "B"

NEUROLOGÍA

19/05/2021

DR. JOSÉ LUIS GORDILLO GILLÉN

Presenta:

- **ROMINA CORONADO ARGUELLO**



Enfermedad de Canavan:

Características clínicas: La mayoría de las personas con enf. de Canavan tiene la forma neonatal/infantil.

Aunque estos bebés parecen normales en una etapa temprana de la vida, entre los 3 y 5 meses de edad, la hipotonía, el retraso de la cabeza, la macrocefalia y los retrasos en el desarrollo se hacen evidentes.

Con la edad, los niños con enfermedad de Canavan de inicio neonatal/infantil a menudo se vuelven irritables y experimentan trastornos del sueño, convulsiones y dificultades para alimentarse.

- La deglución se deteriora y algunos requieren alimentación nasogástrica o gastrostomías de alimentación permanente.
- La rigidez de las articulaciones aumenta, por lo que estos niños se parecen a los personas con parálisis cerebral.
- Los niños con enfermedad de Canavan leve/juvenil pueden tener un desarrollo motor o del habla normal o levemente retrasado temprano en la vida sin regresión.
- La mayoría de los niños con formas leves de la enf. de Canavan tienen un tamaño de cabeza normal, aunque se han informado macrocefalia, retinitis pigmentosa y convulsiones en algunas personas.

