



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ESCUELA DE MEDICINA

6to Semestre

Grupo "B"

NEUROLOGÍA

RESUMENES

Dr. JOSE LUIS GORDILO

Presenta:

- **ADRIAN ESPINO PEREZ**

Síndrome de Guillain Barre 2

- Es una enfermedad inflamatoria del SNP y es la causa más común de parálisis flácida aguda, con una incidencia global anual de aproximadamente 1-2 por 100,000 personas. Los pacientes típicamente se presentan con debilidad y signos sensoriales en las piernas que progresan a los brazos y los músculos craneales, aunque la presentación clínica de la enfermedad es heterogénea y existen varias variantes.
- La progresión puede ser rápida y la mayoría de los pacientes alcanzan su máxima discapacidad en 2 semanas. Aproximadamente 20% de los pacientes presentan formas respiratorias. Debe considerarse como un diagnóstico en pacientes que tienen debilidad bilateral rápidamente progresiva de piernas y brazos, presenta parestesias distales o pérdida sensorial acompañadas o seguidas de debilidad que comienza en las piernas y/o brazos.
- Los reflejos están disminuidos o ausentes en la mayoría de los casos, la distonía es común.
- Diagnóstico :- Debilidad progresiva bilateral de brazos y piernas
- Reflejos tendinosos ausentes o disminuidos
- Fase progresiva dura de días a 4 semanas