



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

AUTISMO

MATERIA
NEUROLOGIA

DOCENTE:
DR. GORDILLO GUILLEN JOSE LUIS

PRESENTA
GONZÁLEZ REQUENA NYMSSI MICHELL

Comitán de Domínguez, Chiapas a 26 de febrero del 2020

AUTISMO

El TEA se caracteriza por deficiencias en la interacción social y la comunicación, y la presencia de conductas restringidas y repetitivas. Ahora el TEA se encuentra entre los trastornos del neurodesarrollo más comunes (con estimaciones actuales de 1 de cada 68 niños en Estados Unidos).

▶ La identificación precoz y temprana de los TEA es fundamental particularmente dada la creciente prevalencia, los considerables costos familiares y sociales y la importancia reconocida de la intervención temprana.

▶ La detección e intervención temprana son efectivas para mejorar los resultados del lenguaje y mejorar muchos síntomas graves característicos y asociados al trastorno.

Diagnóstico.

- ▶ Síntomas de comunicación social en la primera infancia.
- ▶ Limitaciones significativas en comportamientos sociales no verbales: Se evalúa.
 - Contacto visual
 - Expresiones faciales
 - Gestos
 - Coordinación e integración
 - Lenguaje corporal de comportamientos.
- ▶ Limitaciones significativas en la reciprocidad socioemocional
- ▶ Limitaciones significativas en las relaciones sociales
- ▶ Adherencia inflexible a rutinas.
- ▶ Preocupaciones o intereses restringidos.
- ▶ Comportamientos sensoriales (comportamientos atípicos a los sentidos.)