

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ESCUELA DE MEDICINA

6to Semestre

Grupo "B"

NEUROLOGÍA

16/06/2021

DR. JOSE LUIS GORDILLO GUILLÉN

Presenta:

- **ROMINA CORONADO ARGUELLO**



Bebé Hipotónico 2

Una historia familiar detallada puede ser muy útil: es necesario obtener un historial familiar de enfermedad neuromuscular: historial de abortos repetidos puede sugerir una variedad de trastornos con inicio prenatal, retraso en el desarrollo, hitos motores retrasados y muerte prematura. Los factores de riesgo prenatal incluyen: edad de los padres, consanguinidad, antecedentes de exposición a fármacos o teratógenos, enfermedades maternas, movimientos fetales reducidos, polihidramnios y presentación de nalgas. Los antecedentes de infecciones congénitas aumentan la probabilidad de disfunción del SNC como causa subyacente de hipotonía. Se debe realizar una documentación de complicación de parto, traumatismo perinatal del parto, puntuaciones de Apgar bajas y horas de inicio de la hipotonía.

El examen físico debe incluir la evaluación de los signos clínicos relevantes, incluida evaluación neurológica detallada y una evaluación de los caracteres dismórficos.

La debilidad se puede evaluar mediante el llanto, expresiones faciales, la succión y el reflejo de Moro, movimientos antigravitatorios y el esfuerzo respiratorio.