

# **RESUMEN DE ESCLEROSIS MULTIPLE 3**

**Medicina humana**

**Dr. José Luis Gordillo**

**PRESENTA:**

**Andrés Alonso Cancino García**

**GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:**

**6to Semestre Y Grupo B, Neurología**

**Comitán de Domínguez, Chiapas**

**Fecha: 24/04/2021**

# Los Síntomas reversibles de la esclerosis múltiple y su tratamiento

## (Esclerosis Múltiple 3)

29/04/2021

Hay diferentes tratamientos para la esclerosis múltiple, como son: modificadores, rehabilitación y sintomático.

Los síntomas son variados debido a su presentación en diferentes localizaciones, los síntomas más característicos son: dolor, fatiga, distorción de esfínteres, distorción sexual, cognición, alpecia y anemia.

### - Dolor:

- Neurolgias trigémino: carbamazepina, oxcarbazepina, eslicarbazepina, lacosamide y otros con la cirugía por cirugía y radiocirugía
- Neurolgias - distorsión: Gabapentina, pregabalin y gabapentina, antidepresivos: Amitriptilina y duloxetina, Opiáceos: tramadol o codeína.
- Dolor: AINES (ibuprofeno, naproxeno), paracetamol, amitriptilina o Gabex.

### - Fatiga:

- Ejercicio físico: Aerobio y piscina
- Evitar desencadenantes: calor o frío de la noche
- Fármacos: Amantadina, melitronidato, antidepresivos y otros anticolinérgicos

### - Distorción de esfínteres

- Urgencia miccional: naldexida, biperiden, clonidina, losina bolutina o fesoterodina
- Retención urinaria: Tamsulosina o auto sondajes
- Estreñimiento: laxantes o enemas.

### - Distorción sexual:

- \* Distorción erectil: sildenafil, tadalafil o inyecciones papaverina
- \* Anorgasmia: Ringer medicaciones.

### - Cognición:

- Rehabilitación cognitiva o actividad cognitiva y medidas de soporte (notas, audífonos, etc.)

### - Espasticidad:

- Ejercicios: estiramientos o rehabilitación
- Fármacos: Baclofeno, tizanidina, sativex, tizanidina (regular la marcha, o bot)
- Medidas invasivas: Bupivacina intratecal de b. lumbosacra y toxina botulínica.

### - Trastornos psiquiátricos:

- Depresión: fármacos antidepresivos, psicoterapia, grupos de apoyo y ejercicio físico (potente antidepresivo).
- Ansiedad: benzodiazepinas, antidepresivos, psicoterapia, soporte y ejercicio físico (potente ansiolítico).
- Otros: insomnio (neurolepticos, melatonina y inductores del sueño).

Alfonso Alonso Cancino Garcia Medicina Humana  
6to B° Neurología N. lista 2 EM3 (Resumen)