

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ESCUELA DE MEDICINA

6to Semestre

Grupo "B"

NEUROLOGÍA

11/03/2021

DR. JOSÉ LUIS GORDILLO GUILLÉN

Presenta:

- ROMINA CORONADO ARGUELLO



Distonias

Las distonias focales primarias se clasificaron como colicres, espasmos ocupacionales, también se denominaron como psicógenos.

Características clínicas:

- Blefaroespasma
- Distonia oromandibular, torticollis
- Distonia espasmódica

Lo distonia se ha definido como un sx que consiste en contracciones musculares sostenidas, que con frecuencia provocan torsiones y movimientos repetitivos o posturas

→ Distonia primaria: Con o sin anormales patrón hereditario.

→ Distonia secundaria: Con otras afecciones neurológicas hereditarias o debido a una causa ambiental conocida.

Clasificación por Fahn, Marsden y Calne

- o Edad de inicio
- o Distribución
- o Etiología

Síntomas de distonia:

- o Distonia primaria → Autosómica dominante u otras causas
- o Distonia secundaria → Desconocidas y adquiridas
- o Distonia degenerativa
- o Distonia plus → Coexistencia de parkinsonismo o mioclonos

o Las contracciones musculares pueden ser continuas, obligando a las extremidades y el tronco a adoptar posturas sostenidas, pero también pueden ser discontinuas e irregulares como los del blefaroespasma.

o Algunas contracciones distónicas pueden ser discontinuas e irregulares.

o Los cambios posturales pueden ser espasmódicos o tónicos, dinámicos o fijos o cualquier combinación.

