

RESUMEN DE SINDROME DE TOURETTE

Universidad del Sureste

Medicina Humana

NEUROLOGIA

Dr. José Luis Gordillo Guillen

PRESENTA:

Karen Paola Morales Morales

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

6to semestre y grupo B, Neurología.

Comitán de Domínguez, Chiapas

Fecha: 10/03/2021

Síndrome de Tourette

Los tics → Pueden definirse como movimientos rápidos, estereotipados, involuntarios, recurrentes y no propositivos de la musculatura esquelética y faringolaríngea. Aunque son involuntarios, el px puede ejercer control sobre estos movimientos, pero no de forma completa o permanente. Estos tics exageran cuando el individuo está sometido a una situación emocional intensa o a estrés. Disminuyen durante la distracción o durante la atención sin ansiedad, desaparecen en el sueño y aumentan con tensión emocional.

El síndrome de Gilles de la Tourette asocia múltiples tics a vocalizaciones involuntarias, insultos, palabras obscenas e impulsos sexuales agresivos. Aparece en la infancia con un simple tic, pero posteriormente se añaden otros tics y vocalizaciones, también se pueden tener comportamientos obsesivo compulsivo.

Cuadros asociados:

- Trastorno obsesivo compulsivo.
- Trastorno por déficit de atención.
- Hiperactividad
- Alteraciones congénitas
- Trastornos de personalidad
- Depresión
- Ansiedad
- Alteraciones conductuales.