

Victor Daniel Gonzalez Hernandez

### "Esclerosis múltiple 3"

Tratamiento sintomático de la EM. Los más conocidos son los modificadores que ayudan a frenar la enfermedad a que no progrese. El tratamiento rehabilitador y el tx sintomático. Los síntomas de la EM son muy variados. Los síntomas pueden variar desde el dolor hasta la disfunción sexual. El dolor es muy variado porque depende de las localizaciones, topográficas, el manejo del dolor será extender en todos los pacientes, tres grupos de dolores, Cefalías, migrañas, neuralgia del trigémino. Otro gran síntoma en la EM es la fatiga aquí se ven a cubrir los desconciertos, se recomienda el ejercicio físico, fármacos (Amantadina, Metilfenidato) y cuidar el calor y la higiene del sueño. Disfunción de esfínteres: Aquí son medidas higiénicas. Urgencia Miccional: hay fármacos que son bastante efectivos (Tolterodina, Tona babilina). Retención urinaria: se utilizan relajantes de la cápsula prostática como la Tamsulosina. Disfunción sexual: la erección es la más frecuente se trata con Viagra, Sildenafil. La Anorgasmia no tiene un tratamiento dirigido. Alteraciones cognitivas: No tiene un tx farmacológico pero si existen herramientas para la rehabilitación cognitiva y las medidas de soporte. La Espasticidad es una rigidez o falta de agilidad se utilizan fármacos como Baclofeno, Tizanidina, en las medidas invasivas encontramos a la bomba intelectual de baclofeno o la bomba babilina y en los ejercicios: Estiramientos y rehabilitación.