



# Universidad del Sureste

## Escuela de medicina

Nombre:

Erick Alexander Hernández López

Materia:

Crecimiento y desarrollo biológico

Tema:

Métodos de planificación familiar

Dr. Gerardo Cancino Gordillo

**Comitán de Dominguez, Chiapas  
a 15 de Abril de 2021**

Clasificación de los Metodos	Modo de Empleo	Efictividad y Eficacia	Contraindicacion	Efectos Adversos	Estado
Pildora	La primera pastilla se toma el primer dia de la menstruacion, al terminar de tomar las pastillas del paquete, se deja un espacio de 7 dias sin tomar pastillas, durante las cuales se presenta la menstruacion.	98%	Tromboflebitis, jaquecas con aura, insuficiencia hepatica grave, diabetes mellitus con enfermedad vascular, cancer de mama.	Sangrado leve, sensibilidad en las mamas, presion arterial en las mamas, cefalea, nauseas, hinchazon, sincope	
Parche	Se pega sobre la piel (gulteo, abdomen, brazo, espalda), se cambia cada semana y se usa en la semana de la menstruacion.	99%	Embarazo, migraña con aura, trastornos de cuagulacion, cancer de mama o cancer hepatico.	Irritacion en la piel, cambios en la regularidad en la que se presenta la menstruacion, cefalea, nauseas y vomito	
DIU MIRENA	Se intrudce en el utero y pueden permanecer ahi de 3 a 6 años. Tiene que ser puesto y retirado por un medico.	99%	Embarazo, enfermedad inflamatoria pelvica, infeccion vaginal no tratada, malformaciones de cavidad uterina, neuplasias uterinas, enfermedad de wilson.	Sangrado irregular, sensibilidad en las mamas en el canal cervical, periodos irregulares, colicos.	
Implante subdermico	Es colocado debajo de la piel del brazo.	99%	Lactancia materno, ETEV aguda, ictus, sangrado vagina inexplicable, cancer de mama, cirrosis severa	Mareo, cefalea, amenorrea, dolor abdominal o espalda, libido, resistencia a la insulina.	
Inyecciones Depo-Provera	Hay dos presentaciones: la aplicacion mensual: que contiene hormonas combinados (estrogenos y progesterona), mientras que la trimestral contiene solo progestina.	97%	Embarazo, sangrado genital sin diagnostico, trastorno de cuagulacion severo, adenoma hepatico.	Cefalea, nauseas o mareos, manchas en la piel, cambios en la menstruacion.	
Anillo vaginal	Anillo claro y flexible de polietileno que se inserta en la vagina.	98%	Embarazo, cancer cuello uterino, vaginitis, ETS.	Sangrado irregular, cefalea, nauseas, libido, sensibilidad de las mamas, inflamacion e irritacion de la vagina.	
Anticonceptivos de emergencia	Conocida como la pildora del dia siguiente, y se toma en los tres dias siguientes de una relacion sexual sin proteccion.	--	Trastornos de cuagulacion, embolismo pulmonar	Nauseas o vomitos, mareos, fatiga, cefalea, sensibilidad de las mamas, dolor abdominal, retencion de liquidos, sangrado irregular.	
Condon masculino	Cubierta que envuelve al pene erecto y funciona como barrera impidiendo el paso de espermatozoides hacia la vagina y proteccion contra ETS.	85%-95%	Alergico al latex o al espermeccida.	Irritacion, reaccion alergica y es posible que se rompa.	
Condon femenino	Vaina que se adapta holgadamente a la vagina y funciona como barrera impidiendo el paso de espermatozoides hacia la vagina y proteccion contra ETS.	95%	Alergico al latex o al espermeccida.	Irritacion y reaccion alergica.	