



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

CASO CLINICO

Presentan

José Lenin Quiñones López

Docente:

Dr. Suarez Martínez Romeo

8° semestre, grupo "B"

Materia:

URGENCIAS MEDICAS

Comitán de Domínguez, Chiapas, 14/03/2021

Se trata de paciente masculino de 28 años de edad, con antecedente de diabetes tipo 1 de reciente diagnóstico, mal apego a tratamiento médico. Es llevado al servicio de urgencias por presentar quemaduras de 2o grado, unas cuantas de 3er grado en tórax, abdomen y miembros inferiores con aceite caliente.

Valoras a tu paciente y lo encuentras con los siguientes signos vitales FC 120x' FR 28x' TA 110/70 tep 37C satO2 94% peso 85kg talla 170cm glicemia apilar Hi

-De acuerdo a los datos antes mencionados como darías la indicación para manejo de líquidos inicial en este paciente (cantidad y tipo de solución). Utiliza la regla de los 9 y fórmula Parkland.

Líquidos a razón de 4 ml/ Kg/ SCQT: (4)(85)(54)= 18,360 ml, solución Salina o Ringer Lactato. Primeras 8 horas: 9, 180 ml (1, 200 ml/Hra) Próximas 16 horas: (600 ml/ Hra)

- ¿Qué tipo de insulina utilizarías y como darías la indicación para su administración? En bolo: 0.1 UI/ Kg (8.5 UI) IV Sostén: 0.1 UI/ Kg/ Hra (8.5 UI/Hra)

- ¿Al paciente se le considera gran quemado? Si por que presenta mas de 20% de quemadura corporal (54%)