



**Universidad del Sureste
Escuela de Medicina**

Urgencias Medicas

“Cuadro Comparativo”

Dr. Suarez Martínez Romeo.
Grado: 8 semestres Grupo: “A”

Estudiante:

Eduardo Ernesto Zavala Barco

25 de abril del 2021
Comitán de Domínguez, Chiapas

*EVC isquémico**EVC hemorrágico**Definición*

Ocurre cuando un coágulo obstruye y disminuye de manera brusca el flujo sanguíneo de una vena o arteria cerebral. Esto provoca que la sangre no llegue a una parte de nuestro cerebro y el tejido quede dañado.

Ocurre cuando se rompe un vaso cerebral. Cuando esto ocurre y el vaso se rompe provoca que la sangre irrumpa en el cerebro, lo que hace que el tejido cerebral se comprima y se dañe.

Factores de riesgo

- Ateroesclerosis de grandes vasos
- Hipertensión arterial
- Edad avanzada
- Hipercolesterolemia
- Diabetes
- Fibrilación auricular

- Tabaquismo
- Hipertensión arterial crónica
- Alcoholismo
- Edad avanzada
- Abuso de drogas
- Malformaciones congénitas
- Traumatismo
- Diátesis hemorrágica

Etiología

- Embolismo
- Ataques isquémicos transitorios
- Trombosis aterosclerótica



- Aneurismas
- Traumatismos
- Malformaciones arteriovenosas
- Problemas en la coagulación

Síntomas

- Hemiparesia
- Disfasia
- Diplopía
- Disartria

- Cefalea
- Náuseas y vómitos
- Signos de irritación meníngea
- Hipertensión intracraneal
- Pérdida de control de movimientos
- Vértigos
- Disartria
- Marcha inestable

Diagnóstico de imagen



Tratamiento

TAC
RMT
Tomografía Axial
Angiografía Cerebral
Reposo en cama con Cabecera elevada a 30°.
Si hay hipertensión ENALAPRIL 5 mg/24 horas.
LABETALOL 100 mg/12 horas.
CAPTOPRIL 25 mg/8 horas.
LISINOPRIL 5 mg/24 horas
ANTIEDEMA CEREBRAL: MANITOL 1g/kg (dosis única, repetir/6 horas).
ANTIAGREGACIÓN: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 300 mg

TAC
RM
Tomografía Axial

Quirúrgico drenaje del hematoma
craniectomía
Ventriculostomía cuando hay irrupción ventricular
Reposo en cama con Cabecera elevada a 30°
Si hay hipertensión ENALAPRIL 5 mg/24 horas.
LABETALOL 100 mg/12 horas.
CAPTOPRIL 25 mg/8 horas.
LISINOPRIL 5 mg/24 horas