

Inspección

Se evalúa el grado de rotación en la IRC
existe atofia muscular hasta llegar a la cavexia

apreciar la coloración de la piel

Presencia de depresiones o abultamiento

expresión de agrandamiento renal

También fistulas cutaneas

Facie renal

caracterizada por el edema de cara con la

localización palpebral, la palidez de los

tegumentos, la livides en los labios, es un

paciente con movimiento lento y que no cede

el dolor en ninguna posición.

Palpación

Paciente en decúbito dorsal descansando

la cabeza en una almohada con los músculos

del cuello y de una nuca bien relajados

Brazos extendido

Palpación parietal


Presencia de
masas
sensible o no

casos de
tumor
renal

Hidronefrosis
Quistes de
riñon

Hematoma
Perirrenal

absceso
perinefrítico



Percusión de Murphy

- se percute la fosa renal con el puño cerrado

Percusión de Giordano

se percute la fosa renal con el borde cubital de la mano

Palpación de ureteres

Punto ureteral superior

Punto ureteral medio

Punto ureteral inferior

Auscultación

la auscultación de las regiones lombares y los flancos han adquirido renovado interés en relación con la pesquisa etiológica de la hipertensión arterial.

La búsqueda de soplos debe hacerse con el sujeto en decúbito lateral con las piernas flexionadas sobre el abdomen.