

# Semiología

► **Concepto y tipos de dolor:** El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso central. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si está existiera.

⇒ Tipos de dolor

▲ **Evolución:** Crónico: Dura más de 3 meses, como el dolor oncológico. Agudo: Dura poco tiempo, menos de 2 semanas.

▲ **Etiología:** Nociceptivo: Es el producido por una estimulación de los nociceptores. Ejemplo: un pinchazo.

Neuropático: Es producido por una lesión directa sobre el sistema nervioso central. El dolor se manifiesta ante estímulos mínimos o sin ellos.

▲ **Localización:** Somático: Está producido por la activación de los nociceptores de la piel, hueso y partes blandas.

Es un dolor agudo, bien localizado, en general dolores provenientes de zonas inervadas por nervios somáticos.

Ejemplo: Dolor de hueso, artritis o musculares.

Visceral: Está ocasionado por la activación de nociceptores por infiltración, compresión, distensión, tracción o isquemia de vísceras pelvicas, abdominales o torácicas.

► **Concepto y tipos de vómito:** Es la salida, forzada o no, de los contenidos del estómago, que suben a través del esófago para ser finalmente expulsados por la boca. No es en sí una enfermedad, sino que puede aparecer como síntoma de otras dolencias o enfermedades.

"Emesis"

→ Tipos de vomito:

- ▲ **Por patogenias** = De origen central. El centro del vomito se estimula directamente por afecciones del SNC.
  - = **Vomitos reflejos**: estimulación del centro del vomito por vía nerviosa y de forma indirecta.
  - = **Vomitos gástricos**: Ocurren por patologías gástricas inflamatorias o por trastornos del vaciamiento gástrico.
  - = **Origen vestibular**: el equilibrio se obtiene gracias al oído interno y cuando se desequilibra se producen vomitos.
  - = **Vomitos gravidicos**: Aparecen en el primer trimestre de embarazo, luego ceden y desaparecen.
- or su aparición: = **Vomito brusco**: es el típico vomito central.
- = **En ayunas**: Característicos en alcohólicos y embarazadas.
- = **Post prandial**: Característicos de las lesiones del estómago.
- = **Tardío**: se da de 6h a 12h después de comer, se da por alteraciones del vaciamiento gástrico.
- or su aspecto:
  - = **Vomito alimentario**: Contenido discernible.
  - = **Vomito bilioso**: Aspecto amarillizo-verdoso, implica que el estómago es permeable.
  - = **Vomito porráceo**: aspecto verdoso. Indica este nivel del ID.
  - = **Calidez**: no es frecuente, recuerda al aspecto de las heces. Por obstrucción intestinal baja.

= **Vomito hemático** o aparición de sangre en el vomito.

▶ **Concepto de fiebre y tipos** o Es el aumento de la temperatura corporal por encima de la temperatura corporal normal. Muy a menudo, la fiebre es un síntoma de una infección.

### Tipo/clasificación

≡ Por temporalidad

- Aguda o Aquella que no supera los 15 días de evolución.
- Prolongada o Aquella que se extiende por más de 15 días.
- De origen desconocido o Entidad febril definida no solo por su temporalidad (mayor a 3 semanas).

≡ Por patrón o

- Intermittente o Las elevaciones térmicas retornan a valores normales durante cada día de fiebre.
- Continua o No presenta variaciones mayores a  $0,6\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Remitente o Durante su evolución, nunca se alcanzan valores normales durante cada día de fiebre.
- Recurrente o Reaparece luego de uno o más días sin fiebre cuantificada. Puede presentar patrones intermitente, continuo o remitente.

**Concepto de Diarrea y tipos** o Se define como diarrea a la expulsión de materia fecal no formada o anormalmente líquida acompañada de una mayor frecuencia en el ritmo evacuatorio.