

Esquema de Vacunación

Nacimiento	BCC	Hepatitis B		
2 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Neumococo conjugada
4 meses	Pentavalente acelular		Rotavirus	Neumococo conjugada
6 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Influenza
7 meses			Segundas dosis	
12 meses	SRP			Neumococo conjugada
18 meses	Pentavalente acelular			
24 meses (2 años)				Influenza Refuerzo anual
36 meses (3 años)				Influenza " "
48 meses (4 años)	DPT (refuerzo)			Influenza
59 meses (5 años)				Influenza refuerzo
72 meses (6 años)				SRP refuerzo
11 años o 5° de primaria				VPH

Adolescentes y adultos

• Td	Tetanos, difteria	15 años cada 10 años
• SR	Sarampión, rubéola	≥ 11 años
• Anti-hepatitis B	Hepatitis B	11 años sin antecedentes de vacunación
• VPH	Virus del papiloma humano	Niños 5° primaria o 11 años, no embarazadas
• Tdap	Tetanos, difteria, tosferina	Embarazadas de 19 Semana 20 a 32 19-29 con FR
• Antiinfluenza	Influenza	60 años obligatoria
• Antineumococo bivalente	Neumococo	14-59 años con FR 65 años obligatoria