

colecistitis

La colecistitis aguda es una inflamación (hinchazón) de la vesícula biliar. Por lo general, es causado por un cálculo biliar que queda atrapado en uno de los conductos o aberturas de la vesícula biliar.

a quien afecta

La colecistitis aguda es una complicación poco común de los cálculos biliares.

Aproximadamente del 1 al 4% de las personas con cálculos biliares experimentan episodios poco frecuentes de dolor, conocidos como cólico biliar. Aproximadamente una de cada cinco de estas personas desarrolla colecistitis aguda si no se extirpa quirúrgicamente la vesícula biliar.

sintomas

un dolor intenso, agudo y constante en la parte superior derecha del abdomen (barriga), que puede empeorar al respirar profundamente o si se toca el abdomen una temperatura alta, o fiebre, de 38°C (100,4°F) o más

La colecistitis aguda no suele ser una emergencia médica. Sin embargo, sin tratamiento, puede provocar una serie de complicaciones graves y potencialmente fatales, como:

la muerte del tejido de la vesícula biliar, llamada colecistitis gangrenosa, que puede causar una infección grave

la vesícula biliar se abre, conocida como vesícula biliar perforada

causa

otras causas

Enfermedades graves, como el VIH o la diabetes

Tumores de la vesícula biliar (raro)

Algunas personas tienen mayor riesgo de sufrir cálculos biliares. Los factores de riesgo incluyen:

- Ser mujer
- Embarazo
- Terapia hormonal
- Edad avanzada
- Ser nativo americano o hispano
- Obesidad
- Bajar o subir de peso rápidamente
- Diabetes

Los cálculos biliares son pequeños cálculos que se forman en la vesícula biliar, generalmente hechos de colesterol.

Si un cálculo biliar queda atrapado en la abertura principal de la vesícula biliar, llamado conducto cístico, puede causar que la vesícula biliar se inflame gravemente. No está claro exactamente por qué el conducto bloqueado causa una inflamación tan grave.

MARIO DE JESUS SANTOS HERRERA