

La apendicitis aguda es la enfermedad quirúrgica de emergencia más común. Cirujanos generales en todo el mundo; en México no es la excepción, ocupa Al evaluar a los pacientes, los médicos de urgencias los ponen en primer lugar dolor de estómago. El diagnóstico de apendicitis es principalmente clínico, el motivo es Su ubicación y la variedad de síntomas pueden confundirse fácilmente con otros. Imágenes inflamatorias o infecciosas de la cavidad abdominal. La apendicitis es Se divide en cuatro etapas, desde el inicio de la inflamación hasta Perforación (congestión, absceso, necrosis y perforación). A lo largo de los años, ha sido posible descubrir más casos y Debido al progreso, la precisión del diagnóstico se ha mejorado enormemente. Tecnología y conocimiento de cada enfermedad. sin embargo, Los informes estadísticos continúan apareciendo en la literatura, donde El rango de error es del 20% al 40%. La escala de Alvarado incluye puntuaciones basadas en síntomas, signos y cambios. El examen de laboratorio reveló un paciente con sospecha de apendicitis aguda. Luego, agregue puntos y categorícelos en consecuencia. Esto Los criterios considerados por la escala de Alvarado son dolor en fosa derecha y Leucocitosis > 10.000 células / mm³, hay 2 puntos, dolor migratorio, dolor Descompresión, fiebre, náuseas o vómitos, anorexia, leucocitosis, neutrófilos > 75% 1 punto. Luego de determinar el puntaje de Alvarado, clasificarlo como Diagnóstico sospechado menos de 5 puntos, sugerente 5-6 puntos, 7-8 puntos Posible apendicitis y de 9 a 10 muy posible apendicitis, de las cuales El diagnóstico fue apendicitis. Por tanto, es importante determinar si esta relación es muy importante Puede ser utilizado como herramienta de diagnóstico por los mejores médicos. Considerando su simplicidad y facilidad de uso Gestión estándar. Con cualquier nivel de acceso, podemos reducir costos, Complicaciones relacionadas con el proceso de infección y la ejecución del procedimiento. mas apropiado.



Escala de Alvarado

Apendicitis aguda

	Puntos
Síntomas	
• Migración del dolor	1
• Anorexia	1
• Náuseas/ vómito	1
Signos	
• Dolor en cuadrante inferior derecho	2
• Rebote (+)	1
• Fiebre	1
Laboratorio	
• Leucocitosis	2
• Desviación a la izquierda de neutrófilos	1
Total	10

9 - 10 puntos: Casi certeza de apendicitis
 > 7 puntos: Alta probabilidad de apendicitis
 6 - 8 puntos: Consistentes con apendicitis pero no diagnóstico
 < 4 puntos: Baja probabilidad de apendicitis aguda

La información en este sitio es solo para fines educativos. No debe ser utilizada como sustituto de la atención médica profesional.

