

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

La escala de Glasgow, una de las más utilizadas, fue elaborada por Teasdale en 1974 para proporcionar un método simple y fiable de registro y monitorización del nivel de conciencia en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Originalmente, se desarrolló como una serie de descripciones de la capacidad de apertura ocular y de respuesta motora y verbal. En 1977, Jennett y Teadsle asignaron un valor numérico a cada aspecto de estos tres componentes y sugirieron sumarlos para obtener una única medida global, la escala de coma de Glasgow, tal y como la conocemos hoy.

Escala de coma de Glasgow		
Reacción examinada	Nivel de alteración	Puntuación
Apertura de ojos	Espontánea	4
	A orden verbal	3
	En respuesta a un estímulo doloroso	2
	Sin reacción	1
Respuesta verbal	Correcta, el paciente está orientado	5
	Responde, pero está desorientado	4
	Usa palabras inapropiadas	3
	Emite sonidos incomprensibles	2
	Sin reacción	1
Respuesta motora	Obedece órdenes	6
	Sabe localizar el estímulo doloroso	5
	Reacción flexora normal (retira la extremidad en respuesta al estímulo doloroso)	4
	Reacción flexora anormal (postura de decorticación)	3
	Respuesta extensora (postura de descerebración)	2
	Sin reacción	1