

CUADRO COMPARATIVO DE HEMATOMA “EPIDURAL Y SUBDURAL”.

Epidural.	Subdural.
1.- morfología: lente biconvexa.	1.- morfología: semilunar.
2.- mortalidad: del 5 – 10 %, su lesión es vascular principalmente arterial un 85% proveniente de la arteria meníngea media.	2.- mortalidad: del 40 – 60%, su lesión es venosa principalmente las venas comunicantes.
3.- localización: entre la duramadre y el cráneo.	3.- localización: entre la duramadre y la aracnoides.
4.- por lo general es agudo por trauma, su periodo de lucidez seguido de pérdida de la conciencia.	4.- por lo general es agudo, subagudo, y crónico, por lo general hay cefalea y confusión que incrementa gradualmente.
5.- el hematoma toma forma de lente biconvexa en el TAC.	5.- el hematoma abraza al cerebro en el TAC.
6.- criterios quirúrgico: Glasgow menor de 8, focalización neurológica, hematoma mayor de 30 ml, hematoma mayor de 15 mm, desplazamiento de la línea media mayor de 5 mm.	6.- criterios quirúrgicos: deterioro neurológico, focalización neurológica, anisocoria, hematoma mayor de 10 mm, con desplazamiento de la línea media mayor de 5 mm.
	