

TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA:

Este conjunto de etapas se llama Al parecer, pueden ocurrir enfermedades relacionadas con enfermedades, salud y mortalidad. El crecimiento, la densidad y la estructura de la población varían. Fue formulado por Omram en 1971. La transformación epidemiológica comprenderá tres etapas, que se caracterizan por: 1. La peste y el hambre dominan cuando no son humanos Herramientas para controlarlos. 2. Las epidemias restantes siguen mostrando resistencia Vacunas o lesiones donde persiste la enfermedad. 3. Enfermedades degenerativas y enfermedades provocadas por el hombre que están ocurriendo Actualmente se presenta en el uso de psicofármacos, beber alcohol, Contaminación ambiental y falta de prevención Transmisión sexual, etc.

¿CUÁL ES EL PANORAMA DE LA TRANSICIÓN EPIDEMIOLOGICA A NIVEL MUNDIAL, EN MEXICO, Y EN CHIAPAS?

1: La transformación de una sociedad tiene su traducción Refleja directamente el estado de salud y enfermedad de su población. en diferentes En un momento histórico, miembros de una misma sociedad enfermaron y murieron Por diferentes razones. Una disciplina que estudia los factores que determinan cada momento histórico La frecuencia y distribución de enfermedades en la población es Epidemiología llamada. Su nombre proviene de la palabra popular, en griego Se refiere a enfermedades o enfermedades sociales que afectan a la población. Tal La enfermedad se considera una epidemia y se deben cumplir tres condiciones: peso corporal Alta mortalidad o morbilidad, que afecta gravemente Socioeconómico, político y / o cultural; y una posición destacada entre ellos Temas relacionados con la opinión pública.

Durante siglos, las enfermedades infecciosas que son de naturaleza contagiosa han sido la principal causa de enfermedad y muerte en todo el mundo. El mundo; incluidas epidemias como peste, cólera, viruela, tuberculosis, etc. Paludismo, paludismo, fiebre tifoidea, difteria, sífilis, recientemente, VIH SIDA. Desde mediados del siglo XX, ha comenzado la transición La epidemiología y las enfermedades no transmisibles cobran cada vez más importancia (ENT), crónicas y no infecciosas, representadas por nuevas epidemias Global: enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad Enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. La lesión también ganó peso, Es el resultado de un accidente (de tráfico, familiar, laboral), Varias formas de envenenamiento, suicidio y violencia (violencia doméstica, Ciudad, guerra).

Las razones de este cambio epidemiológico son diversas. Entre ellos cabe Mencionar el proceso de envejecimiento de la población en todas las áreas de la región. El mundo; el proceso migratorio, especialmente el proceso migratorio interno de lo rural a lo rural Ya hay ciudades donde vive más de la mitad de la población mundial; y cambia En términos de estilo de vida, especialmente la adopción de hábitos alimentarios poco saludables, Falta de actividad física; consumo de tabaco, alcohol y otras drogas; estrés psicosocial; y otras conductas peligrosas, como no tener relaciones sexuales Protección o conducción imprudente.

2: Desde principios del siglo XX, México ha cambiado Comportamiento epidemiológico más allá de la enfermedad Además de los cambios ambientales, demográficos, económicos y sociales, Cultura y progreso en el cuidado de la salud Cambió las características del país y afectó la imagen personal. Epidemiología y existencia de Enfermedad o muerte en la población mexicana. estos años, Observó un fenómeno que se puede llamar "transición de riesgo" porque En la primera mitad del siglo XX, la población estuvo expuesta a Los riesgos inherentes al país en las primeras etapas de desarrollo social e infraestructura, Se caracteriza por mala higiene, mala eliminación de excrementos y agua. Consumo humano de baja calidad, hacinamiento, convivencia con animales Familias, esquemas de vacunación incompletos, cobertura insuficiente y Subutilizado. Como resultado, se han modificado las formas de vida y apoyan nuevos riesgos, como la exposición segregada, el estrés, el tabaco y el uso de medicamentos, la violencia y las compras de modelos de alimentos para alimentos, obesidad y obesidad, colesterol alto y hipertensión arterial. Factores responsables de la carga global sobre la enfermedad y han considerado la obesidad y otras enfermedades crónicas, que han dado lugar a enfermedades degenerativas en una fase inicial. El declive de la mortalidad infantil es el primero posterior que los países han alcanzado. Esto y la consistencia de la expectativa de vida se pueden correlacionar con las mejores enfermedades socioeconómicas. El desarrollo de la mortalidad en este último fue determinado por el desarrollo de sistemas sanitarios y mejoras. Las condiciones de vida de la población fueron un factor fundamental en los auspicios de la expectativa de vida de las personas. Para México, en 2030, la firma Laser en Laserergistrat 2016 será más grande en las lanas laslistas, que tiene 75 años. Asimismo, esto es superior a mujeres en casi cinco años en hombres; Lo anterior, una coronora de diferencias en los niveles de mortalidad a través del sexo en todas las edades del grupo, incluido el fenómeno conocido como comosobemenaridad masculina, que se expresa en el número de dehistes de hombre por 100 muertes femeninas. 3: A mediados del siglo XIX, la teoría de la transición demográfica se postuló para explicar el desarrollo de la mortalidad y las tasas de fertilidad a partir de la situación de las observaciones de varias poblaciones europeas (Chesnais, 1986). La teoría de la transición demográfica marca las tasas de crecimiento natural de la población a largo plazo. En general, se refiere al cambio de una alta mortalidad y un régimen porcentual, en empresas de transición, baja mortalidad y porcentaje (Frenk et al. , 1991), típico de una compañía post-transición. Elemance Elegance Elegance Características con bajas tasas de crecimiento de la población generan la combinación de tasas de fertilidad altas y estables y tasas de mortalidad, pero no estables. El régimen posterior a la transmisión muestra la cantidad de crecimiento a través de la interacción de bajos bajos y bajas tasas de mortalidad para la fertilidad (Chackiel y Martínez 1993).

Chiapas es un estado caracterizado por una población multicultural y multilingüe en la que se reconocen oficialmente doce idiomas locales es una reunión heterogénea que regresa a una mayor riqueza cultural; Sin embargo, también es una de las entidades más altas índices de pobreza y marginales junto con las tasas infantiles y de maternidad más altas en el país. Otro aspecto tomado en consideración en la composición demográfica del estado de Chiapas es la edad de la población a medida que forman los campos de la salud previa de Preens. La pirámide de población hasta 2014 muestra una base amplia al menos durante los primeros años. Como un alto efecto de la fertilidad, entre 10 y 20 años y luego, se reduce gradualmente por un modelo moderado de emigración temprana; Por lo tanto, la proporción de adultos mayores (65 años) es uno de los más bajos de México. Chiapas tiene una estructura de AgeJove, a partir del 34. 3% corresponde al individuo de 15 o menos, mientras que el adulto mayor de Laproprouk (65 años y más) escucha solo el 4,9% del monto total. La gente del empleado, del 15 al 64, forma el 60. 9% de los residentes del Estado, con los cuales se centran los desafíos del sistema de salud en el tratamiento de las condiciones pediátricas y la prevención de la población de profundidad. La estructura de la edad de Chiapasampy que el volumen de la población en la era del trabajo ha alcanzado una composición relativa mucho más amplia en términos de la población durante los tiempos dependientes. El 61% práctico de la población estatal es una edad productiva, y el porcentaje debe continuar aumentando en los próximos años, ya que aún está por debajo del promedio nacional, el 63,6%. Algunos epidemiólogos argumentan que las diferencias entre la morbilidad y la mortalidad son un producto de actitudes y comportamientos asociados con la salud, la higiene y el lavado (LAMB, 1996), donde la falta de ejercicio físico, la dieta inadecuada y el consumo de alcohol y el tabaco se encuentran entre los principales factores. de riesgo de supervivencia individual. De esta manera, los epidemiólogos (Saforcada, 2001) desarrollaron una teoría que se asocia con el riesgo de morbilidad y mortalidad con el comportamiento individual, conocido como la teoría de los factores. Dentro de la teoría de los factores de riesgo, se entiende como un factor de almezanista causal, que tiene como objetivo explicar la relación de que los distintos niveles de los individuos con variables económicas, sociales, políticas, culturales y ecológicas, mientras que los factores de riesgo pueden estar disponibles como Los dispositivos asociados con un cambio de la probabilidad de un evento enfermo. En esta sección analizaremos algunos de los muertos más importantes del mundo en México y Chiapas. A lo largo de 15 años (1998-2013), la evolución de las causas de la muerte en México muestra que las enfermedades, las enfermedades degeneradas comenzaron un crecimiento lento y continuo en enfermedades dañinas de tipo contagioso infeccioso; Sin EM BARGO, en los estados de Comchiapas, el perfil de mortalidad presenta retrasos significativos, lo que aún se despiertan para observar cómo las enfermedades infecciosas y parasitarias cobran a las personas, especialmente en áreas de difícil acceso o en las capas más bajas.