



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



DOCENTE:
DRA. MONICA GORDILLO RENDON

ALUMNO:
LUIS ALBERTO ALVAREZ HERNANDEZ

MATERIA:
MEDICINA FISICA Y DE REHABILITACION

UNIDAD:
TERCERA

TEMA:
CUADRO SINOPTICO CARACTERISTICAS CLINICAS POLINEUROPATÍA DIABETICA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a; 13 de mayo del 2021.

POLINEUROPATÍA DIABÉTICA

Periférica

- Es la más común.
- Bilateral, simétrica y distal → predominio sensorial.
- Instauración lenta y progresiva: guante o calcetín.
- Dolor paroxístico: quemante, urente y profundo.
- Afectación de reflejos tendinosos y de la marcha.

Autonómica

Es de larga evolución y tiene otras complicaciones

Gastrointestinales

- Estreñimiento.
- Incontinencia fecal.
- Diarreas postprandiales y nocturnas.
- Atonía, etc.

Genitourinario

- Dificultad en la micción.
- Vaciamiento incompleto.
- Pérdida de la sensación vesical.
- Disfunción eréctil.

Cardiovasculares

- Taquicardia en reposo.
- Hipotensión ortostática.
- Muerte súbita.

Otras complicaciones

- Anhidrosis.
- Retraso en la reacción pupilar.

Proximal

Debilidad, atrofia y dolor de los músculos de pelvis y muslo, unilateral o bilateral.

Mononeuropatía

Par craneal 3
Par craneal 6

Dolor agudo, localizado de inicio brusco, y es reversible a las 6 semanas más diplopía, más desviación externa del ojo.

Periférica

Progresiva

Bibliografía

- Manual AMIR neurología y neurocirugía 12.^a edición.
- Manual CTO neurología y neurocirugía 11.^a edición.