

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS

MATERIA: INMUNOLOGÍA

**DOCENTE: DR SAMUEL ESAÚ FONSECA
FIERRO**

ALUMNO: MARCOS GONZÁLEZ MORENO

SEMESTRE Y GRUPO: 4°A

TEMA:

**“MENSAJERIA INMUNOLOGICA: LAS
CITOSINAS Y SUS RECEPTORES”**

“MENSAJERIA INMUNOLOGICA: LAS CITOSINAS Y SUS RECEPTORES”

Todas las células del sistema inmunitario necesitan estar conectadas entre sí para elaborar de forma conjunta y ordenada una respuesta que termine con la eliminación del patógeno. Para ello, las células utilizan dos medios principales de comunicación: uno es el contacto directo mediante las distintas moléculas de membrana. Otra forma de relacionarse, igualmente importante, es mediante la síntesis y Liberación de Pequeñas proteínas que reciben el nombre genérico de citosinas.

Estas citosinas son producidas en los primeros instantes de la activación celular, alertando a Las diferentes células que poseen receptores de citosinas en la membrana, de que hay una respuesta inmunitaria en marcha.

A menudo tienen un efecto local. Actuando en el espacio de reconocimiento antigénico, aunque también pueden actuar sobre dianas que se encuentran más alejadas Sus funciones son regularla duración y la amplitud de la respuesta inmunitaria, tanto innata como específica, reclutar células a la zona en conflicto (inflamación), el inducir la generación de nuevas células a partir de los precursores hematopoyéticos. Una de las formas de comunicación entre células más utilizada en el sistema inmunitario es la síntesis de citosinas.

Las citosinas son pequeñas proteínas sintetizadas por muchos tipos celulares, pero especialmente por macrófagos y linfocitos T. cuando se activan en respuesta a distintos estímulos (patógenos, toxinas.) Estas citosinas se unen en las células diana a receptores específicos, caracterizados por tener una gran afinidad por su ligando. La unión de la citosina a su receptor provoca una cascada de reacciones bioquímicas en el interior celular, que dan como resultado la regulación de la actividad de la célula Diana. Activando o inhibiendo su función o su expansión. Las citosinas actúan como hormonas del sistema inmunitario, aunque de acción generalmente local y están implicadas en la elaboración de la respuesta inmunitaria tanto innata (inflamación. quimiotaxis), a través de la activación de macrófagos y linfocitos NK. Como adaptativa, humoral o celular (actuando sobre los linfocitos T y B). Sirviendo de conexión entre los dos tipos de respuestas. Por otro lado, estas proteínas cumplen una función muy importante en la regulación de la hematopoyesis, induciendo el crecimiento y diferenciación de los precursores de los distintos linajes, hematopoyéticos según van siendo necesarios para mantener al organismo protegido de los patógenos. El sistema inmunitario y el sistema neuroendocrino se comunican mediante factores solubles, para los que también comparten receptores. La acción de las citosinas está fuertemente regulada por varios mecanismos, uno de ellos es la existencia de antagonistas que son capaces de inhibir la acción de las citosinas para evitar efectos perjudiciales en el caso de una síntesis excesiva.