

Dengue

Se estima que 1 de cada 5 casos de infección por el virus del dengue es sintomático.

La infección sintomática por el virus del dengue más comúnmente se presenta como una enfermedad aguda y febril, entre leve y moderada, los primeros hallazgos clínicos no son específicos pero se debe estar muy atento porque reconocer los primeros signos de shock e iniciar rápidamente la terapia intravenosa puede reducir el riesgo de muerte en los pacientes con dengue grave.

Signos y Síntomas

El Síntoma más común del dengue es la fiebre junto a: Malestias y dolores (dolor en los ojos, dolor muscular, dolor en las articulaciones y los huesos) Náuseas y vómitos

Los síntomas del dengue generalmente duran entre 2 y 7 días.

Los signos de advertencia comienzan entre 24 y 48 horas después de que haya desaparecido la fiebre.

ChinKungunya

La fiebre por ChinKungunya se caracteriza por la aparición súbita de fiebre generalmente acompañada de dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser debilitantes pero generalmente desaparecen en pocos días. La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos los dolores articulares pueden durar varios meses e incluso años.

Se han descrito casos ocasionales con complicaciones oculares, neurológicas, y cardíacas y también molestias gastrointestinales.

Los complicaciones graves no son frecuentes pero en personas mayores puede contribuir a la muerte sintomológica.

La enfermedad aparece de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito infectado y puede durar el mismo tiempo en la fase aguda.

- Fiebre mayor a 39°C
- Dolor en:
 - Articulaciones
 - Cabeza
 - Espalda
 - Músculos
- Náuseas
- Erupciones
- Conjuntivitis

Zika

La enfermedad por el virus de Zika es causada por un virus transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes que vive durante el día, los síntomas generalmente levan y de 2 a 7 días de duración. Las infecciones por el virus del Zika durante el embarazo puede causar microcefalia y otras malformaciones congénitas, también se asocia con el Peilo Remoturo y el aborto espontáneo.

Síntomas:

Muchos personas infectadas por el virus del Zika no manifiestan síntomas o solo son leves.

- Fiebre
- Sorellido
- Dolor de cabeza
- Dolor de las articulaciones
- Dolores musculares
- Conjuntivitis

Por lo general las personas

que se infectan por Zika no se sienten suficientemente mal para ir al hospital y es muy raro que mueran a causa de este virus.

Los síntomas de Zika son muy similares a los de otros virus que se propagan a través de picaduras de mosquitos.