

Jose Francisco Pérez Pérez

## SARAMPION, RUBEOLA Y VARICELA

	SARAMPION	RUBEOLA	VARICELA
Agente Causal	Virus Del Sarampion. Fam. Paramyxoviridae. Genes. morbillivirus	Virus de la Rubéola. Fam. Togaviridae del Grupo Rubivirus.	Varicela zoster. de la familia herpesvirus.
EDAD	Se contrae durante la infancia entre los 12 meses y 4 años	Niños de 2 años o 2 y 4 años de edad.	menores de 10 años.
VIA De TRANSMISION.	Contacto directo con las secreciones nasales o de la garganta de personas infectadas.	Gotitas de flüssig con la nariz de la nariz y garganta.	Directamente al tocar la ampolla de alguna infectado o a través de su saliva o líquidos nasales.
PERIODO DE INCUBACION.	7-18 días (media 14 días)	12 a 23 días	10 - 21 días
PERIODO De CONTAGIO.	8 días, 4 días antes de la aparición del sarampion.	2 días antes de la aparición de las erupciones	7 días antes de las erupciones.
Signos Característicos.	Fiebre leve-moderada, Tos seca, secreción nasal, conjuntivitis, dolor de garganta.	quejadas erupciones, con de erupciones descendente.	erupción roja con gránulos blancos con líquido, costras.