

NOMBRE	PRESENTACION	VIA DE ADMINISTRACION	DOSIS	REAACIONES ADVERAS
<b>Albendazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tabletas de 200 y 400 mg y en suspensión oral de 200 y 400 mg/ml.</li> </ul>	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>400 mg como dosis única</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>diarrea y cólicos abdominales, anorexia.</li> </ul>
<b>Mebendazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tabletas masticables de 100 y 500 mg y suspensión oral</li> </ul>	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>caso de ascariasis es de 100 mg dos veces al día, en la mañana y en la noche durante tres días consecutivos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Algunas veces produce dolor abdominal transitorio y diarrea</li> </ul>
<b>Metronidazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se presenta en tabletas de 500mg, ampolletas de 500 mg y óvulos de 250 mg</li> </ul> Crema y gel	ORAL, INTRAVENOSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>La dosis que se utiliza es de 500 mg tres veces al día durante 5 a 10 días.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>náuseas, vómito, anorexia, diarrea, dolor epigástrico, mareo</li> </ul>
<b>Diyodohidroxiquinoleina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se presenta en tabletas de 650 mg. Otras presentaciones: suspensión.</li> </ul>	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>La dosis que se administra es de 650 mg tres veces al día durante 20 días.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>gastrointestinales, fiebre, erupción cutánea, crecimiento de la glándula tiroidea, color amarillo de piel y de cabello</li> </ul>
<b>Tinidazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tabletas de 500 mg.</li> </ul>	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 mg tres veces al día durante tres días.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>gastrointestinales: náuseas, vómito, dolor abdominal</li> </ul>
<b>Prazicuantel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tabletas de 150 y 600 mg</li> </ul>	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 mg/kg/día en tres dosis divididas por un día.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea, fiebre, somnolencia, anorexia y erupción cutánea son los más comunes</li> </ul>

<b>Pirantel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tabletas de 100, 125 y 250 mg. suspensión</li> </ul>	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La dosis recomendable es de 11 mg/kg hasta 1 g como dosis única</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dolor abdominal transitorio, náuseas, vómito, diarrea, vértigo, cefalea, fiebre y mareos.</li> </ul>
<b>Cloroquina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tabletas de 150 mg.</li> </ul>	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primera dosis: 600 mg inicial, después 300 mg a las 6, 24, 48 horas. Segunda dosis: 300 mg una vez al día. Tercera dosis: 300 mg una vez al día</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prurito, cefalea, hipotensión arterial, trastornos visuales, caída del cabello y cardiomegalia</li> </ul>
<b>Mefloquina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tabletas de 250 mg</li> </ul>	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 mg una vez por semana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vómito, diarrea, dolor abdominal, cefalea, fiebre, erupción cutánea</li> </ul>
<b>Pirimetamina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tabletas de 25 mg.</li> </ul>	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dosis de 100 mg, dos veces al día durante el primer día, seguida de 50 a 75 mg diarios durante 3 a 6 semanas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• anorexia y vómito.</li> <li>• A dosis altas produce anemia megaloblástica y leucopenia</li> </ul>
<b>Primaquina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tabletas de 5 y 15 mg.</li> </ul>	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La dosis que se administra es de 15 mg/día durante 14 días. Además, se utiliza en pacientes con neumonía por Pneumocystis jiroveci y la dosis recomendada es de 15 a 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• metahemoglobinemia, dolor abdominal y la hemólisis</li> </ul>

			mg/ durante días	día 14