

NOMBRE	PRESENTACION	DOSIS	REACCIONES ADVERSAS
<b>La anfotericina B</b>	Solución inyectable de 50 mg	La dosis diaria de anfotericina B oscila entre 0,3 a 1 mg/kg/día con una dosis	Anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y calambres abdominales, escalofríos, cefalea
<b>Nistatina</b>	Suspensión oral con 100,000 U/ml. Tabletas vaginales con 100,000 U	Oral. Adultos 400 000 a 600 000 UI cada 6 horas Niños 100 000 UI cada 6 horas Vaginal adultos 100,000 U cada 12 a 24 horas durante 12 días	Nauseas, vomito, diarrea, dolor abdominal y ocasionalmente prurito y dermatitis, irritación, ardor y resequedad vaginal
<b>Natamicina</b>	Gotas al 5%	Queratitis. Una gota de suspensión al 5% cada 1 a 2 h durante los primeros 3 a 4 días	quemosis o hiperemia conjuntival
<b>Ketoconazol</b>	comp. 200 mg, crema al 2%. gel al 2%, Ovulos 400 mg	La dosis usual para adultos es de 400 mg/día, Niños mayores de 2 años pueden recibir 3,3 a 6,6 mg/kg en una sola toma diaria	náuseas, anorexia y vómitos
<b>Fluconazol</b>	10 mg/ml Polvo para susp. oral. 100 mg Cáps. Dura 150 mg Cáps. dura	150mg de como dosis oral única Niños > 4 sem: 6-12 mg/kg/día. máx. 400 mg/día	Nauseas, vómitos, anorexia
<b>Terbinafina</b>	Estuche con un tubo de aluminio con 25 g o estuche con un frasco PEBD con 30 g	Crema de 250mg/24hv Manos de 6 semanas Pies 12 semanas	Enrojecimiento o prurito ocurren ocasionalmente en el sitio de la aplicación
<b>Daptomicina</b>	Solución inyectable de 500 mg	vía intravenosa como una perfusión durante 30 minutos	Dolor De Cabeza, Nauseas, Vomito. Diarrea, Infección Fúngica, Neuropatía Periférica
<b>Polimixina - a</b>	Adultos y niños de > 2 años: la dosis recomendada es de 15.000-25.000 unidades/kg/día en dos administraciones o por infusión intravenosa continua		Nefrotoxicidad, Alergias, nauseas

<b>polimixina B</b>		Adultos y niños de > 2 años: la dosis recomendada es de 15.000-25.000 unidades/kg/día en dos administraciones o por infusión intravenosa continua	Nefrotoxicidad, Alergias, nauseas