

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

“Rinitis alérgica”

Presenta: Mayra Mercedes Lopez Morales

MATERIA: inmunoalergia

Semestre: 8°

Grupo: “B”

Docente: Dra. Luna Villanueva Lía Gabriela

Comitán de Domínguez, Chiapas

02 marzo del 2021.

Rinitis

T.R.

Dx >19 años.

Alergica

Definición

Enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal mediada por anticuerpos IgE alérgeno-específicos, con participación de diversas células, citocinas y mediadores.

Cuadro clínico.

- Trastornos de sueño
- Dolor de cabeza
- Irritación en ojos
- Lagrimeo
- Estornudos repetitivos
- Picazón nasal (prurito)
- Hipertrofia de cornetes
- Tos
- Sangrado nasal
- Rinorrea hialina
- Prurito ocular
- Ojeras.
- Anosmia.
- Patidez de mucosa.

- Aprox. 10 a 20% de la población mundial
- E.O. 9 al 16%
- 80% desarrolla síntomas antes de los 20 años.

Diagnostico (Criterios)

- 1 Presencia de lo más síntomas típicos (estornudos, rinorrea, prurito nasal, congestión).
- 2 Patrón de síntomas estacionales o perennes persistente.
- 3 Pruebas cutáneas o sanguíneas positivas p/alérgenos específicos.
- 4 Resultados de las pruebas alérgicas correlacionados con la H.C.


La rinitis se puede clasificar en:

- 1 **Tiempo:**
 - * Estacional
 - * Perenne
 - * Episódica.
- 2 **Frecuencia:**
 - * Intermitente
 - * persistente
 - * Episódica.
- 3 **Severidad:**
 - * leve
 - * Moderada
 - * Severa

TRATAMIENTO

- 1 Evitar contacto con alérgeno.
 - 2 Vig. y seguimiento
 - 3 Síntoma episódico: Antihistamínico Ocl. o nasal.
 - 4 leve a moderada: Antihistamínico Oral y nasal.
 - 5 moderada/severa: Esteroides nasal
- * Concomitante → inmunoterapia específica
* Manejo Qx.

Fisiopatología



Mastocito → Fisiopato

F.R.

Dx En adultos > 19 años.

- ① Cuadro Clínico
- ② Historia clínica y E.F.
- ③ Pruebas cutáneas de punción.
- ④ Dx. definitivo es cuando se confirma la presencia de IgE específica vs alérgeno.

Factores de riesgo:

- ① Antecedentes familiares
- ② IgE > 100 UI/ml antes de los 6 años de edad.
- ③ > Estado socioeconómico
- ④ Exposición a alérgenos (Animales y Acaros)
- ⑤ Presencia de una prueba cutánea alérgica positiva.

