

Urticaria

A.F.F.

PREVALENCIA EN MÉXICO

DEFINICIÓN

Reacción inmunológica e inflamatoria de la piel ante diversos factores etiológicos. Produciendo histamina y otros mediadores que ocasionan vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Se caracteriza por nódulos y prurito.

ETIOLOGÍA

- ✓ Idiopática: Causa desconocida de UA. En crónicas mayor.
- ✓ Inmune: Mediada por IgE, como la alimentaria.
- ✓ No inmune: Anafilaxis del ácido araquidónico o de granulación del mastocito.

1. Demografía: Hidroxina
2. Urticaria colinérgica: Hidroxina
3. Por frío: Ciproheptadina
4. Urticaria retardada por presión: Frecuentemente requieren corticoides orales.

TRATAMIENTO

- 1 Anti H₁ orales
- 2 Anti H₂
- 3 Corticoide
- 2 Corticoides sistémicos Para casos graves o refractorios
- 3 Adrenalina Casos graves con anafilaxia
- 4 Ciclespina Casos crónicos refractorios

1 Habbón

(Pápulas o placas edematosas rosadas o blanquecinas que pueden ser de extensión variable).

2 Purito

(Puede acompañarse de síntomas gastro o respiratorios)

urticaria colinérgica

Elevación de la temperatura corporal (ejercicio, fiebre, ducha caliente).