

Dermatitis atópica

Condición inflamatoria de la piel caracterizada por prurito intenso y piel seca.

- Etiopatogenia

Predisposición genética

Disfunción de la barrera cutánea

Inflamación persistente de la dermis

mutación en el gen filagrina

- un progenitor afectado 60% de prevalencia
- ambos progenitores 80%

- Diagnóstico clínico

(se basa en un conjunto de signos y síntomas).

Clasificación por evolución

Fases por localización

Lactante 0-2 años: mejillas, cuello, cuero cabelludo, extremidades

Infantil 2-12 años: flexura cubital/poplitea, zona periorbitaria, dorso de manos.

Adolescente >12 años: flexuras, cuello, dorso de manos y pies

Criterios de Hanifin y Rajka

Mayores

- Prurito
- Morfología/distribución
- Carácter crónico o recidivante.
- Historia familiar

Menores

(deben cumplir tres o más):

- Xerosis
- Ictiosis
- Reactividad a pruebas cutáneas
- IgE sérica elevada
- Temprana edad
- Quelitis
- Eccema de pezón
- Infecciones cutáneas
- Pitiriasis alba
- Conantivitis recurrentes

- Epidemiología

enfermedad crónica de la piel más común en la infancia

Afecta hasta un 20% de niños